LIBRARY

THE NEW YORK BOTANICAL GARDEN
1891 1991
HORTICULTURE · SCIENCE · EDUCATION

Conservation Work Performed
with funds from the 1994-95
New York State
Conservation/Preservation
Discretionary Grant Program

n. e. A. Lips. 1815.
m Liget.

fl.

NOVA
GENERA & SPECIES
PLANTARUM

NOVA
GENERA & SPECIES
PLANTARUM
SEU
PRODROMUS
DESCRIPTIONUM VEGETABILIUM,
MAXIMAM PARTEM INCOGNITORUM
QUÆ
SUB ITINERE IN INDIAM OCCIDENTALEM
ANNIS 1783—87
DIGESSIT
OLOF SWARTZ. M. D.

HOLMIÆ, UPSALIÆ, & ABOÆ,
In Bibliopoliis Acad. M. SWEDERI.
MDCCLXXXVIII.

Many shall run to and fro, and Knowledge shall be increased.

DAN. XII.

PRAEFATIO.

INDIA occidentalis, ſive Inſulæ ſic dictæ Antillicæ, non minus qvam reliquæ inter Tropicos ſitæ regiones, inſignem admodum Vegetabilium ferunt proventum. Qvorum ingens omnino numerus, diligentiſſima multorum diverſis temporibus facta perqviſitione, dudum eſt inveſtigatus. Sed & ſic plurima reſtare tamen futuris Naturæ ſcrutatoribus reſervata, fatebuntur periti rerum exiſtimatores; licet trecenti prope effluxerint jam anni, ex quo novum detexerunt Europæi orbem.

ILLOS inter, qui enodandæ harum regionum Hiſtoriæ naturali laudabili niſu operam ſuam conſecrare voluerunt, commemorandi ſunt præcipue ROCHEFORT, LABAT, THEVETUS, LINOCIER, PLUMIER & SLOANE.

FACERE non poſſumus, qvin magnopere admiremur ſtupendam illam adcurationem, ſollertiam & ſagacitatem in cunctis, quæ Pater PLUMIER elucubravit, operibus conſpicuam. Quibus profecto haud poterit carere, qui Naturæ, in hiſce orbis tractibus, theſauros felici cum ſucceſſu indagare ſibi propoſuerit. Celebris hujus Auctoris *Filices*, *plantæ Americanæ & Icones per beat. Burmannum editæ*, 900 prope continent Vegetabilium Figuras, quæ prius tantum non omnia fuerunt incognita; ingentem illam ut ſilentio prætereamus Botanicarum multitudinem figurarum, quæ publicam lucem nunqvam adſpexerunt.

205363

INDEFESSO ſtudio, jam ſua dudum ætate conatus eſt Cel. SLOANE ea colligere omnia, quæ ad Hiſtoriam naturalem Jamaicæ amplificandam pertinerent. Luculentum ſatis huic rei perhibet teſtimonium Itineris, qvod ad hanc Inſulam inſtituerat, deſcriptio, *) figuras 546 exhibens. Quæ, utut minoris magna ex parte momenti, honorabilem tamen Auctori inter *Fundatores* Botanicos **) vindicant locum.

EUM poſteriori tempore excepit Cel. BROWNE in exploranda Naturali hujus Inſulæ Hiſtoria. Cui rei etiam omnem, qvem poterat, impendit laborem & induſtriam. In ſyſtematicum ordinem cuncta diſpeſcuit, inventarum ſimul a ſe Plantarum egregias addens figuras, eo majori in pretio habendas, qvod eas artificioſiſſimis Incliti illius EHRETI manibus æri incidendas curaverat. Aſt horum obſervationes Duumvirorum ad Jamaicam ſolam inprimis ſpectabant, quæ non niſi exiguam conſtituit Archipelagi Indiæ occidentalis portionem.

QUÆ antea peragraverat Cel. PLUMIER loca, eorum plurima deinde inviſit celebratiſſimus Ille JACQUIN. Qvi qvo ingenuo mentis ardore adamatæ a ſe Scientiæ auctibus provehendis invigilaverit, indicio eſſe potuerunt, *Enumeratio Plantarum Americanarum, Selectarum ſtirpium Americanarum Hiſtoria, Obſervationes Botanicæ*, & q. ſ. r.

AB hac mundi parte & ex his oris, ego quoque haud ita pridem redii, non exiguis Floræ divitiis o-

nu-

*) Voyage to Jamaica etc. 1707.
**) Linn. phil. bot.

nuſlus. De eo lætus, quod licuerit mihi præſtantium adeo Scientiæ Naturalis cultorum fidis inſiſtere veſtigiis, multa ab iis relicta colligere, & perfectius luſtrare, quæ illis adcurate examinandi defuit occaſio, propero jam Orbi Botanico exponere fructum jucundi mihi plus ſimplici laboris. Qvinque omnino præterlapſi ſunt anni, ex quo in Floræ, tropicos inter habitantis adyta intromitti mihi dabatur. Inſulæ Antillicæ diverſo, una poſt alteram, tempore a me freqventabantur, Jamaica, Cuba, Hiſpaniola: quarum tamen iſta maximam mihi videbatur mereri animi attentionem.

Est enim hæc ipſa Inſula, ubi plurimum temporis ſub hac mea profectione exegi, cujusque interiores quoque regiones montanis in tractibus ſitas penetravi, immo ea luſtravi loca, qvæ aditu non modo perqvam difficilia ſed et prorſus invia exiſtimata fuerunt. Hiſce in locis plures longe eosque diverſos Naturæ fetus cognoſcere mihi licuit, qvam viderant Antecesſores mei, & ut in temperato magis Climate, minusque adeo torrentibus ſolis caloribus expoſitus, aliqua cum commoditate inqviſitiones meas perſeqvi potui; ſæpe etiam jucunda quorundam Anglorum, ibi verſantium, ſocietate ſtipatus, quibus innoteſcendi propenſaque illorum mihi comparandi ſtudia, qvod occaſio ſeſe obtulerit, id vero gratum mihi & opportunum accidit.

Insigni, poſt brevem adeo in illis plagis commorationem, collectione prope 850 novarum ſpecierum Vegetabilium ditatus, Angliam repetebam A:o. 1786. Magna hujus collectionis pars adcuratius jam digerebatur, dum liber mihi pateret aditus ad præcla-

rum

rum Muſeum Ill. JOSEPHI BANKS Baroneti, Societatis Regiæ Anglicanæ Præſidis, qvi nec ipſe ſuam mihi denegabat benevolentiam, qvin ſuis me conſiliis, ſua inſpectione juvare dignaretur. Non poterunt immortales Perilluſtris hujus Viri digne ſatis celebrari laudes. Perſpecta jam dudum habet Litteratus Orbis maxima Illius promerita, incredibile in Scientiam Naturalem penitus ſibi dilectam ſtudium, animumque illum generoſum, quo Scientiarum complectitur Cultores. Satis ſit dixiſſe, Orbi ſero adpariturum, qvi Illi par inveniatur. Indulgenti Illius permiſſu, dum Londini verſabar, auctæ ſunt Collectiones meæ, atque in eum accreverunt numerum, qvem præſens hic ſiſtit Prodromus. Conſtant hæ acceſſiones Vegetabilibus, quæ ex diverſis locis Indiæ Occidentalis jam antea Angliam fuerant transmiſſa, ibique ſtatim a def. Doct. SOLANDRO deſcripta, & eorum exempla in Muſeum illata. Horum in cenſu, unum quoque et alterum novum plane occurrit Genus, quorum ſuo quodque loco aſteriſco (*) notandum duxi.

NEQUE intermittere fas mihi fuerit, qvin gratâ commemoratione profitear, Popularem meum honoratiſſimum, Phil. Mag. JON. DRYANDER, Bibliothecæ Soc. Reg. Lond. Præfectum, cujus excellens in Botanicis ſcientiis ceterisque Hiſtoriæ Nat. partibus cognitio eſt notiſſima, haud parum mihi adtuliſſe adjumenti in perluſtrandis Vegetabilibus Muſei Bankſiani.

QUÆ ut nova a me edita ſunt Vegetabilia, ea certius etiam ab omnibus aliis fuerunt diſtincta, idque eo exactius, quod anſa mihi ſuppeditabatur illa cum reliquiis Linnæanis comparandi, quas poſtquam Svecia perdidit, eo intentiori cura ſervat Anglia.

AD

Ad excludendas Clasſes *Monoeciæ Diœciæ & Polygamiæ*, tam exemplo Cel. Prof. & Eqvit. Thunberg, quam mea ipſius experientia impulſus ſum. Qvum in calidioribus commorarer Zonis, magis ſenſim magisque mihi conſtare cœpit, Arborum plerasque eſſe Polygamas, & multas Hermaphroditarum Linnei ſæpe floribus Maſculinis & Femineis ſeorſum gaudere. Quæ omnia ſatis oſtendunt reductionem harum Clasſium fieri non poſſe modo, ſed & oportere. Quod ad *Gynandriam* attinet, retinendas judicavi præſertim *Orchideas* utpote quæ Clasſem æque profecto diſtinctam efficere videntur, ac *Didynamæ Tetradynamæ & Monadelphæ*. Multiplex & varius, quem flores earum præ ſe ferunt, habitus, adhuc qvidem Genera totius hujus Clasſis valde reddidit incerta & vaga; ſed ſperandum fuerit, detectis poſthac pluribus ſpeciebus, fore ut ea facilius, certiusque explicari queant.

Pluribus in locis Syſtemati conveniens inveni, & cauſas ſufficientes mihi fuiſſe exiſtimavi, cur unum alterumque reducerem Genus ex Americanis, quæ olim in Generibus plantarum determinaverat Linneus, poſtquam mihi licuit adcuratius illa contemplari, eorumque cum cognatis comparationem inſtituere. Pari ratione etiam neceſſarium interdum duxi diſtincta determinare Genera ex quibusdam ſpeciebus cognitorum antea Generum, quum plures offendi, quæ cum illis conveniunt.

Pauca aliorum Auctorum, e. g. Jacqvini, Brownei, Aubleti &c. nova genera necdum Syſtemati Vegetabilium inſerta, de integro determinavi, & in ſuum quodque locum digeſſi, poſtquam adcurate perluſtrata

ta fuerunt & deſcripta. Horum cuique nomen illius appoſui, qui ea primus detexiſe videatur.

Hunc itaque libellum eſſe volui *Prodromum futuri Operis*, quod integras continebit Deſcriptiones harum ſpecierum quæque in publicum prodibunt, qvam primum figuræ, qvibus illuſtrari debent, fuerint perfectæ.

Prius vero Amatoribus ſcientiæ me traditurum ſpero Characteres Naturales eorum Generum, quæ tanqvam nova hic adducta conſpiciuntur; ut et factas meo ſub itinere obſervationes Botanicas. Hoc interim, quod jam exhibetur, ſpecimen inſervire poterit ſupplementi loco Editionis poſtremæ Syſtematis Vegetabilium.

NO-

NOVA GENERA.

CHARACTERES GENERUM ESSENTIALES.

I. BROSIMUM. (MONANDRIA *Monogynia.*)

Dioic. ♂. *Amentum* globoſum undique tectum ſqvamis peltatis. *Cal.* O. *Cor.* O. *Antheræ* bilamellatæ.

♀. *Amentum* maris.
Stylus unicus, 2-fidus.
Drupa 1-ſperma.

II. LACISTEMA. (MONANDRIA *Digynia.* ante *Coriſpermum.*)

Amentum. Cor. 4-partita.
Filamentum bifidum.

III. LITHOPHILA. (DIANDRIA *Monogynia.* *Flores inferi tripetali.*)

Cal. triphyllus. *Cor.* tripetala.
Nectarium diphyllum.

IV. THOUINIA. (DIANDRIA *Monogynia.* *Flores inferi* 4-*petali.*)

Cal. 4-dentatus. *Cor.* 4-petala.
Antheræ ſeſſiles.

V. XIPHIDIUM. * (TRIANDRIA *monogynia.* *inter Wachendorf. & Commelinam.*)

Cor. 6-petala, æqvalis. *Cal.* O.

VI. SCLERIA. (TRIANDRIA *Monogynia.* pone *Schoenum.*)

Monoic. ♂. *Spiculæ* multifloræ.
♀. *Spiculæ* unifloræ.
Semen ſuboſſeum, globoſum.

VII. LEERSIA. (TRIANDRIA *Monogynia.* *poſt Saccharum.*)

Cal. O. *Cor.* bivalvis, clauſa.

VIII. CHLORIS. (TRIANDRIA *Monogynia.* ante *Airam.*)

Polygam. *Cal.* communis bivalvis, biflorus, floſculo *Hermaphrodito* ſeſſili, altero *maſculo* pedicellato.

IX. PICRAMNIA. (TRIANDRIA *Digynia.* *pone Ostridem.*)

Dioic. ♂ *Cal.* 3-partitus. *Cor.* tripetala.
♀ *Cal.* & *Cor.* maris.
Bacca 2-locularis.

X. ERNODEA. (TETRANDRIA *Monogynia.* inter *Ixoram* & *Peresiam.*)

Cor. hypocrateriformis. *Cal.* 4-dentatus.
Bacca 2-locularis. *Sem.* solitaria.

XI. HOFFMANNIA. (TETRANDRIA *Monogynia* post *Peresiam.*)

Cor. hypocrateriformis, 4-partita.
Cal. 4-dentatus. *Filam.* O.
Bacca bilocularis, polyspermа.

XII. COCCOSIPSILUM. (TETRANDRIA *Monogynia.* ante *Hedyotidem.*)

Cor. infundibuliformis. *Cal.* 4-part.
Bacca inflata 2-locularis, polyspermа.

XIII. WALLENIA. (TETRANDRIA *Monogynia.* ante *Callicarpam.*)

Cor. tubulosa. *Cal.* 4-fidus.
Bacca 1-sperma.

XIV. LABATIA. (TETRANDRIA *Monogynia.* inter *Pœneam* & *Blæriam.*)

Cor. subcampanulata. *Cal.* 4-phyllus.
Capsula 4-locularis. *Sem.* solitaria.

XV. BOEHMERIA. (TETRANDRIA *Monogynia* *Fl. incompl. inferi.*)

Monoic. ♂. *Cal.* 4. partitus.
☿. *Cal.* O. *Stylus* 1.
Sem. 1.

XVI. SCHEFFERIA. (TETRANDRIA *Digynia.*)

Dioic. ♂. *Cor.* 4-petala l. nulla.
Cal. 4-5 phyllus.
♀. *Cor.* 4 petala l. nulla.
Cal. 4—5 partitus.
Bacca 2-locularis.

XVII.

XVII. CRANTZIA. (TETRANDRIA *Trigynia.*)
Monoic. ♂. *Cor.* O. *Cal.* 4-phyllus.
♀. *Cor.* O. *Cal.* 5-phyllus.
Caps. 3-cornis, 3-locularis.

XVIII. ARGYTHAMNIA. (TETRANDRIA *Trigynia.* pone *Cuccam.*)
Monoic. ♂. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 4-phyll.
♀. *Cor.* O. *Cal.* 5-phyllus.
Styli dichotomi. *Caps.* 3-cocca.

XIX. BUMELIA. (PENTANDRIA *Monogynia.* inter *Jacquiniam* & *Laugeriam.*)
Drupa 1-sperma. *Cor.* 5-fida.
nectario 5-phyllo.

XX. ARDISIA. (PENTANDRIA *Monogynia.* ante *Varroniam.*)
Drupa monosperma. *Cor.* reflex.
Stigma simplex.

XXI. SOLANDRA. (PENTANDRIA *Monogynia.* inter *Lycium* & *Menais.*)
Bacca 4-locularis, polysperma.
Calyx rumpens. *Cor.* maxima.

XXII. CEPHAELIS. (PENTANDRIA *Monogynia.* inter *Morindam* & *Psychotriam.*)
Bacca 2-sperma. *Cor.* tubulosa.
Receptaculum paleaceum.

XXIII. SABICEA. (PENTANDRIA *Monogynia.* inter *Hamelliam* & *Eritbalem.*)
Bacca 5-locularis, polysperma.
Cor. infundibulif. *Stigma* 5-part.
Involucrum 4-fidum.

XXIV. RUYSCHIA* (PENTANDRIA *Monogynia.* pone *Vitin.*)
Fructus polyspermus. *Cor.* reflexa.
Styius O. *Cal.* 5-phyllus.

XXV. DICHONDRA. (PENTANDRIA *Digynia.* pone *Hydrocotem.*)
Caps. 2 monospermæ.
Cor. rotata, 5-partita.

XXVI. ROCHEFORTIA. (PENTANDRIA *Digynia.* inter *Schreberam & Steridem.*)

Fructus bilocularis, polyſpermus.
Cor. infundibuliformis, fauce aperta.

XXVII. MICROTEA.* (PENTANDRIA *Digynia.* ante *Salſolam.*)

Semen unicum ſubgloboſum, cortice coriaceo echinato tectum. *Cal.* 5-phyllus, patens.

XXVIII. HEPETIS.* (HEXANDRIA *Monogynia.* pone *Tillandſiam.*)

Cor. 3-petala. *Cal.* 3-partitus.
Caps. ſemiſupera. *Sem.* mutica.

XXIX. THRINAX. (HEXANDRIA *Monogynia.* *Flores incompleti.*)

Cal. 6-dentatus.
Stigma emarginatum.
Bacca 1-ſperma, nuda.

XXX. HEDWIGIA. (OCTANDRIA *Monogynia.* pone *Amyridem.*)

Cor. 4-fida. *Cal.* 4-dentatus.
Capſ. 3-locularis.

XXXI. HYPELATE. (OCTANDRIA *Monogynia.* pone *Melicoccam.*)

Polyg. ♀. *Cor.* 5-petala. *Cal.* 4-phyllus.
Drupa 1-ſperma. *Stigma* deflexum.
♂. ut in *Hermaphrodito.*

XXXII. VALENTINIA. (OCTANDRIA *Monogynia.* poſt *Dodonæam.*)

Cal. 5-partitus, coloratus, patens.
Caps. baccata, 4-ſperma, pulpoſa.

XXXIII. PETALOMA. (DECANDRIA *Monogynia.* pone *Murraydam.*)

Petala 5 calyci inſerta.
Cal. cyathi formis.
Bacca 1-locularis.

XXXIV.

XXXIV. CALYPTRANTHES. (ICOSANDRIA *Monogynia*, poſt *Myrtum*.)

Cal. truncatus, operculatus.
Cor. O. *Bacca* 1-4-ſperma.

XXXV. POSSIRA. (POLYANDRIA *Monogynia*, poſt *Marcgraviam*.)

Cal. 4-phyllus (partitus).
Petalum unicum, laterale, ungviculatum.
Legumen 1-loc. 2-valve.

XXXVI. APEIBA.* (POLYANDRIA *Monogynia*, inter *Ciſtum* & *Corchorum*.)

Caps. multilocularis, echinata: *loculis* polyſpermis.
Cal. 5-phyllus.

XXXVII. MARILA.* (POLYANDRIA *Monogynia*, inter *Ciſtum* & *Corchorum*.)

Capſ. 4-locularis. *Cal.* 5-phyllus.
Stigma ſimplex.

XXXVIII. EROTEUM (POLYANDRIA *Monogynia*, inter *Tiliam* & *Muntingiam*.)

Bacca exſucca, 3 loc. polyſperma.
Cal. 5-phyllus. *Stylus* 3-fidus.

XXXIX. LEGNOTIS. (POLYANDRIA *Monogynia*, inter *Muntingiam* & *Elæocarpum*.)

Capſ. 3-locularis. *Petala* receptaculo inſerta, lacera.

XL. LIGHTFOOTIA. (POLYANDRIA *Monogynia*, ante *Laetiam*.)

Polygam. ☿. *Cal.* 4-phyllus. *Stigma* ſeſſile.
Bacca umbilicata, 3-6-ſperma.
♂-☿-hermaphroditi.

XLI. HEDYOSMUM. (POLYANDRIA *Monogynia*. *Apetali*.)

Monoic. ♂. *Amentum* antheris ſeſſilibus tectum.
☿. *Cal.* 3-dentatus, ſuperus.
Stylus triqueter. *Bacca* 3-gona, 1-ſperma.

XLII. ACIDOTON. (POLYANDRIA *Monogynia.* *Apetali.*)

Dioic. ♂. *Cal.* 5-phyllus.
Monoic. *Stam.* receptaculo globoso affixa.
♀. *Cal.* 6-phyllus. *Stylus* 3-fidus.
Caps. tricocca.

XLIII. HOMALIUM. (POLYANDRIA *Trigynia.* ante *Delphinium.*)

Cal. 6-7-partitus. *Pet.* 7.
Stam. 21. per 3 aggregata.

XLIV. TANÆCIUM. (DIDYNAMIA *Angiospermia* ante *Cal.* 2-*fidos.*)

Bacca corticosa, maxima.
Cor. tubulosa, subæqualis, 5-fida.
Rudimentum fil. 5-ti.

XLV. TAMONEA. (DIDYNAMIA *Angiospermia.* pone *Pedalium.*)

Nux. 4-locularis. *Cal.* aristatus.

XLVI. GYMNANTHES. (MONADELPHIA *Triandria.* pone *Iuniperum.*)

Monoic. ♂. *Amentum* nudum.
Dioic. *Stam.* pedicelli 3-partiti l. 3-chotomi, antheriferi.
♀. *Amentum* l. *Germen* pedicellatum.
Stylus 3-fidus. *Caps.* 3-cocca.

XLVII. MYRISTICA. (MONADELPHIA *Triandria.*)

Dioic. ♂. *Cal.* 3-fidus. *Cor.* O.
Filamentum columnare.
♀. *Cal.* 3-fidus. *Cor.* O.
Caps. drupacea, 2-valvis.

XLVIII. OCHROMA. (MONADELPHIA *Petnandria.* pone *Melochiam.*)

1-gyna. *Caps.* 5-locularis.
Cal. 2-plex. *Antheræ* anfractuosæ, connatæ.

XLIX. ALCHORNEA.* (MONADELPHIA *Octandria.*)

Dioic. ♂. *Cal.* 3-5-phyllus. *Cor.* O.
♀. *Cal.* 5-dentatus *Cor.* O.
Stylus 2-partitus.
Capsula dicocca.

ACHA-

L. ACHANIA. * (MONADELPHIA *Polyandria.* inter *Hibiſcum & Althæam.*)
Monogyna. Cal. exter. polyphyllus. *Bacca* 5-ſperma.

LI. MYRODIA. * (MONADELPHIA *Polyandria.* ante *Meſuam.*)
Monogyna. Cal. ſimplex, 1-phyllus. *Petala* 5.
Drupa ſicca, 2-ſperma.

LII. AMERIMNON. (DIADELPHIA *Decandria.* pone *Pterocarpum.*)
Legumen compreſſo-foliaceum, 2-valve, dehiſcens.
Cal. bilabiatus.

LIII. TERAMNUS. (DIADELPHIA *Decandria.* pone *Amorpham.*)
Carina minima, calyce recondita. Stamina alterna, 5-ſterilia.

LIV. STYLOSANTHES. (DIADELPHIA *Decandria.* pone *Æſchynomenen.*)
Legumen 2-articulatum, hamatum.
Calyx tubulatus, longiſsimus, corollifer.

LV. LAVENIA. * (SYNGENESIA *Pol. æqualis.* inter *Spilanthum & Ageratum.*)
Rec. nudum. *Pappus* 3-ariſtatus glanduloſus.
Cal. ſubæqualis.

LVI. TRIXIS. (SYNGENESIA *Pol. neceſſaria* pone *Polymniam.*)
Rec. paleaceum. *Pappus* nullus. *Sem.* apice villoſa.
Corollulæ radii 3-fidæ.

LVII. TETRANTHUS. (SYNGENESIA *Pol. ſegregata.* poſt *Echinopen.*)
Cal. communis 4-florus. *Perianth.* 1-phyllum.
Sem. coronata.
Polygamia æqualis.

RO-

LVIII. ROLANDRA. (Syngenesia *Pol. segregata.* poſt *Echinopen*)
Capitata. Perianth. 2-valve, uniflorum.
Pappus nullus.
Polygamia æqualis.

LIX. MALAXIS. (Gynandria *Diandria.* pone *Ophrydem.*)
Nectarium 1-phyllum, concavum, cordatum, *genitalia* in medio fovens.

LX. CRANICHIS. (Gynandria *Diandria.* poſt *Arethuſam.*)
Nectarium galeatum.

LXI. MARATTIA. (Cryptogamia *Filices.* *Fructif. frondoſæ* ante *Acroſtichum.*)
Capſulæ (fructificat.) multiloculares. *Loculis* ſuperne dehiſcentibus.

NOVÆ SPECIES.

CLASSIS I.

MONANDRIA.

MONOGYNIA.

AMOMUM.

Sylueſtre. 2—3. A. ſcapo nudo, ſpica elongata bracteis oblongis ventricoſis, foliis lato-lanceolatis.
Sloan. jam. 61. *hiſt.* 1 *p.* 165. *t.* 105. *f.* 2.
Amomum 2. *Brown. jam.* 113.
Jamaica. ♃.

COSTUS.

glabrátus. 2. C. foliis utrinque glabris, ſpica pauciflora, ſquamis apice foliaceis, ſummis faſtigiatis. *
Coſtus Linn. H. Cliff. 2. *deſcr.*
Planta. *Mer. Sur. t.* 36.
India occidentalis. ♃

ſpicatus. 3. C. foliis utrinque glabris, ſpica multiflora ſubouata, arcte imbricata: ſquamis ouatis ſimplicibus. Alpinia ſpicata. *Murr. S. V. p.* 51. 2. *Jacqu. am.* 11. *t.* 1.
Inſulæ caribææ. ♄.

arabicus. 1. C. *foliis ſubtus ſericeis.* C. *arabicus Linn.*

ALPINIA.

Occidentalis. 2. A. racemo radicali compoſito erecto, nectario apice emarginato, capſulis triloculari-bus, foliis lanceolato-ouatis glaberrimis.
Jamaica, Domingo, &c. ♃.

racemoſa. 1. A. *racemo terminali ſpicato, floribus alternis, nectarii labio trifido; foliis oblongis acuminatis.* *A. racemoſa Linn.*

CYN-

CYNOMORIUM.

Jamaicenſe 2. C. ſtipite ſquamoſo, amento elongato, ſquamis imbricatis dimidiatis rhomboideis. Cynomorium. *Brown. jam.* 334.
Jamaica, paraſitica.

Cayanenſe. 3. C. ſtipite nudo, amento ſubgloboſo, ſquamis ſubrotundis peltatis.
Cayenna, paraſitica.

BROSIMUM.

DIOIC. ♂. *Cal. Amentum* globoſum, undique tectum ſqvamis orbiculatis peltatis.
Cor. O.
Filamenta ſolitaria inter ſquamas erumpentia.

♀. *Cal.*. *Amentum* maris.
Cor. O. *Stylus* unicus, bifidus.
Bacca monoſperma.

Alicaſtrum 1. B. foliis ouato-lanceolatis perennantibus, amentis globoſis pedicellatis ſolitariis axillaribus, fructu corticoſo. *Alicaſtrum Brown. jam.* 372.

Spurium. 2. B. foliis lanceolato-ovatis, acuminatis, amentis pedicellatis ovatis axillaribus geminis, fructu molli. *Arbor*, foliis oblongis glabris alternis. *Brown. jam.* 369. 8.
Jamaica. ♄

DIGYNIA.

LACISTEMA.

Cal. Amenti ſquama *Cor.* quadripartita.
Filamentum bifidum.
Bacca pedicellata, monoſperma.
(ante *Coriſpermum.*)

Myricoides LACISTEMA.
Piper aggregatum. *Berg. Act. Helv.* 7. *p.* 131. *t.* x.
Jamaica.

CLAS-

CLASSIS II.

DIANDRIA.

MONOGYNIA.

CHIONANTHUS.

compacta. 1–2. C. paniculis trichotomis, ultimis floribus subcapitatis, calycibus villosis, foliis lanceolato-oblongis; antheris acuminatis. *
Insulæ caribææ ♄.

incrassata. 1–2. C. ? paniculis ramis decussatis fastigiatisve, ultimis 3-floris, corollis tetragonis, laciniis erectis incrassatis, foliis oblongis consistentibus.
Iamaica. ♄.

IUSTICIA.

nitida. 6–7. I. fruticosa, foliis ellipticis acuminatis, racemis spicæ-formibus verticillatis, bracteis minutis, pedicellis calycibusque glabris. (antheris *paralellis*) * Justicia nitida *Jacq. am.* 5. *Insulæ caribææ.* ♄.

armata. 8–9. I. fruticosa, aculeata, foliis oblongis emarginatis coriaceis nitidis.
Iamaica. ♄.

acicularis. 8–9. I. fruticosa, diffusa, spinosa, spinis setaceis, floribus pedunculatis axillaribus solitariis.
Iamaica ♄.

pectoralis. 18–19. I. (*Dianthera* L.) caule herbaceo adscendente, foliis lanceolato-linearibus, spicis terminalibus subpaniculatis.
J. pectoralis. *Jacq. am.* 3. *Tab.* 3.
Dianthera 3. *Brown. jam.* 118. 3.
India occidentalis ♃.

reptans 18–19. I. (*Dianthera L.*) caule herbaceo repente foliis obtusis, spica terminali indivisa.
Domingo. ☉.

humi-

humifusa. 18–19. I. (*Dianthera.* L.) caule herbaceo decumbente foliis ovatis cordatisque, spicis umbellatis.
Jamaica. ⊙.

nemorosa. 21–22. I. caule herbaceo tetragono erectiusculo, foliis ovato-lanceolatis, spicis ovatis.
Jamaica, Hispaniola. ♃.

GRATIOLA.

repens. 2–3. G. foliis ovatis, caule repente, calyce 5-phyllo, stylo bifido.
Jamaica.

UTRICULARIA.

obtusa. 4–5. U. nectario inflexo obtuso subemarginato.
Utricularia 1. *Brown. jam.* 119.
Jamaica.

SALVIA.

occidentalis. 6–7. S. foliis ovatis serratis, spicis laxis, bracteis cordatis subtrifloris.
Salvia 1. *Brown. jam.* 117.
India occidentalis. ♃.

tenella. 7–8. S. foliis cordatis, caule filiformi repenti, spicis adscendentibus.
Jamaica. ⊙.

LITOPHILA.

Cayx triphyllus. *Corolla* tripetala.
Nectarium diphyllum.
(*Flores inferi, tripetali.*)

muscoides 1. LITHOPHILA.
Navaza.

THOUINIA.

Cal. quadridentatus. *Cor.* quadripetala.
Antherae petala duo opposita basi connectentes.
Bacca bilocularis. *Loc.* 2-spermibus.
(*Flores inferi* 4 *petali.*)

ligu-

liguſtrina 2. THOUINIA foliis lanceolatis, paniculis terminalibus, floribus erectis.
Jamaica, Hiſpaniola. ♄.

TRIGYNIA.

PIPER.

diſcolor. 3–4. P. foliis lato-ovatis 5-nerviis glaberrimis, poſtice diſcoloribus, ſpicis laxioribus, floſculis remotioribus.
Jamaica. ♄.

macrophyllum. 9–10. P. foliis oblongis acuminatis obliquis multinerviis glabris, petiolis appendiculatis, caule lævi.
Piper 4. *Brown. jam.* 122.
Jamaica. ♄.

geniculatum. 9–10 P. foliis oblongis acuminatis obliquis multinerviis glabris, caule ramisque geniculatis.
Jamaica. ♄.

verrucoſum. 9–10. P. arboreſcens, foliis oblongis acuminatis obliquis multinerviis glabris coriaceis, caule ramisque verrucoſis.
Sloan. cat. 25. h. I. 135.
Piper arboreum. *Aubl. guian.* –
India occidentalis. ♄.

hiſpidum. 9–10. P. foliis ouatis acuminatis obliquis hirſutis rugoſis, nervis alternis, ſpicis erectis.
Jamaica. ♄.

nitidum. 9–10. P. foliis lanceolato-ovatis, baſi obliquis glabris nitidis.
Jamaica. ♄.

alpinum. 10–11. P. herbaceum, caule erecto ſimpliciuſculo, foliis ouato-ſubrotundis acutis, ſubtus a veniis, ſpicis axillaribus.
Jamaica ♃.

hiſpidulum. 10–11. P. herbaceum, erectiusculum, foliis ſubrotundis petiolatis tenuiſſimis, ſuperne hirtis.
Jamaica. ☉.

tenellum. 10–11. P. herbaceum, ſimplex decumbens, foliis diſtichis ouatis aueniis,. margine ciliatis, ſpica adſcendenti.
Jamaica ⊙.

amplexicaule. 11–12. P. ſubherbaceum, foliis lanceolato-ovatis amplexicaulibus nervoſis carnoſis, caule erecto ſimplici.
India occidentalis ♃.

glabellum. 16–17. P. herbaceum, foliis ouatis acuminatis, caule declinato radicante ramoſiſſimo.
Jamaica.

ſcandens. 16–17. P. herbaceum, foliis ouatis acutis, caule radicante ſimplici adſcendenti.
Jamaica.

ſerpens. 12–14. P. herbaceum, foliis ſubrotundo-acutis planis diſcoloribus, caule repente.
Jamaica.

cordifolium. 13–14 P. herbaceum, foliis obuerſe cordatis petiolatis, plano-convexis carnoſis, caule repente.
Jamaica.

nummulariifolium. 13–14. P. herbaceum, foliis orbiculatis convexo-concauis, caule filiformi repente radicante.
Jamaica.

filiforme. 19–20. P. herbaceum, foliis linearibus obtuſis; ſummis verticillatis, caule filiformi repenti.
Jamaica.

ſtellatum. 19–20. P. herbaceum, foliis verticillatis oblongis acuminatis trinerviis glabris, caule erecto.
Jamaica.

CLASSIS III.

TRIANDRIA.

MONOGYNIA.

CAMOCLADIA.

filicifolia. 3. C. foliolis angulato-spinosis. *
Ilex dodonæa, *Spec. pl.* 2. 182.
L. Mant. 333. Dodonæa. *Plum. gen.* 20. *ic.* 118. *f.* 1.
India occidentalis, Antigua. ♄.

HIPPOCRATEA.

comosa. 2. H. paniculis comosis, pedunculis multifidis capillaribus, foliis ovatis acuminatis integris.
Hispaniola. ♄.

volubilis. 1. H. *racemis corymbosis, foliis ovato-lanceolatis serratis.* H. volubilis. *Linn.*

XIPHIDIUM.

Calyx nullus.
Corolla 6 petala, æqualis, infera.
Capsula 3-locularis, polysperma.
(inter *Moræam & Wachendorfiam.*)

floribundum. XIPHIDIUM. *
a. *Loefl. it.* 179.
b. *Aubl. Guian. p.* 33. *t.* 11.
Antillæ, St-Christophori. &c. ♃.

SISYRINCHIUM.

latifolium. 3. S. foliis ensiformibus nervosis, plicatis.
Ixia foliis ensiformibus plicatis glabris caule ramoso. *Plum. ic.* 35. *t.* 46. *f.* 2.
India occidentalis. ♃.

CAREX.

hamata 5–6. C. ſpica ſimplici androgyna lineari, ſuperne maſcula, femineis ariſtatis; ariſtis apice uncinatis æqualibus.
Iamaica.

SCLERIA.

MONOIC. MASC. *Cal. Gluma.* 2-6 valvis multiflora mutica.
Cor. Glumæ muticæ. *Fil.* 1-3.
FEM. *Cal. Gluma* 2 6 valvis uniflora mutica. *Stigm.* 1-3.
Semen globoſum, ſubofſeum.
(poſt *Caricem.*)

Flagellum. 1. S. culmo triquetro ſcandente folioſo ſcaberrimo, foliis trifariam retrorſum aculeatis, floribus paniculatis, rachi villoſa.
S. flagellum. *Berg. act. Holm.* 1765. *p.* 144. t. 4.
Carex lithoſperma. *S.* V. *XIII.*
Schœnus lithoſpermus. *Spec. pl.* 2. *Sloan. h.* 1. 118. t. 77. *f.* 1.
India occidentalis.

mitis. 2. S. culmo triquetro ſcandente foliisque lævibus, floribus paniculatis, rachi glabra. —
Berg. act Holm. 1765. *p.* 145. t. 5.
India occidentalis.

lithosperma. 3. S. culmo triquetro ſcabriuſculo erecto, foliis ſtrictis linearibus margine ſcabris, floribus paniculatis, rachis asperis.
Scirpus lithoſpermus *Sp. pl. I. p.* 51.
Cyperus. *Morſon. l.* 3. *p.* 237. 1. 8. t. 11. *f.* 16.
India occidentalis.

latifolia. 4. S. culmo triquetro, folioſo erecto lævi; foliis lato-lanceolatis nervoſis, floribus paniculatis.
Jamaica.

fili-

filiformis. 5. S. culmo ſimplici filiformi lævi, foliis ſubulatis, ſpica ſimpliciuſcula, floſculis foliolo filiformi ſubjectis, glabris.
Hiſpaniola.

hirtella. 6. S. culmo ſimplici filiformi pubeſcenti, foliis linearibus, ſpica ſimplici, floſculis hirtis.
Jamaica.

SCHOENUS.

ſtellatus. 8–9. S. culmo ſub 3-quetro; ſpiculis conglomeratis involucro foliaceo, baſi colorato.
Sloan. h. 1. 9. 119. t. 78. *f.* 1. *Lamark. Encycl.* 1. 741. *Choin.* 11.
India Occidentalis.

Cladium. 12–13. S. culmo obtuſe triquetro folioſo lævi, foliis antrorſum aculeatis, paniculis diffuſis, ſpiculis unifloris ſeſſilibus diandris.
Cladium *Brown. jam.* 114.
Iamaica.

effuſus. 12–13. S. culmo folioſo, obtuſe 3-quetro lævi, foliis antrorſum aculeatis, paniculis erectioribus, ſpiculis 2-floris ſeſſilibus diandris.*
Iamaica.

Reflioides. 12–13. S. culmo inferne compreſſo-ancipitibus, glaberrimis; floribus paniculatis vaginis apice lanceolatis. *
India occidentalis.

Surinamenſis. 12–13. S. culmo folioſo triquetro, pedunculis corymboſis; inferioribus alternis diſtantibus, ſuperioribus confertis.
Schœnus ſurinamenſis. *Rottb. gram. n.* 89. t. 21. *f.* 1. *Pluk. amalth. p.* 112.
India occidentalis.

Cyperoides. 11–12. S. culmo triquetro folioſo, umbella terminali, ſpiculis glomeratis.
Iamaica.

gracilis. 13– S. culmo triquetro folioſo longiſſimo filiformi, ſpicis lateralibus pedunculatis.
Iamaica.

ſetaceus. 13– S. culmo triquetro ſubnudo, foliis ſetaceis, ſpiculis aggregatis, floſculis diandris.
Jamaica.

puſillus. 13– S. culmo triquetro nudo filiformi, ſpiculis terminalibus ſubfaſciculatis ſeſſilibus, foliolo ſubjecto, ſpicam æquante.
Jamaica.

capillaris. 13– S. culmo triquetro nudo foliisque capillaribus, ſpiculis faſciculatis reflexis involucratis, involucello diphyllo.
Hiſpaniola.

CYPERUS.

viſcoſus. 18–19. C. culmo triquetro nudo, foliis convoluto-teretibus, umbella foliofo decompoſita ſpicis confertis, ſpiculis compreſſis ovatis patentibus. Cyperus 11. *Brown. jam.* 129.
Jamaica. ϒ.

tenuis. 25–26. C. culmo triquetro nudo, umbella ſimplici, ſpiculis ſubulatis confertis, horizontali-reflexis, foliis involucri lineari-ſetaceis.
Jamaicâ.

filiformis. 25–26. C. culmo triquetro nudo filiformi, foliis ſetaceis, ſpicis terminalibus-ſeſſilibus confertis tereti-ſubulatis.
Jamaica.

conferrus. 25–26. C. culmo triquetro nudo, umbella ſimplici foliofa, ſpiculis ovatis conglomeratis, glumis apice recurvis acuminatis.
Jamaica. ϒ.

KYLLINGA.

filiformis. 3–4. K. umbella terminali ſimplici, ſpicis ſeſſilibus pedunculatisque ovatis, ſpiculis ovatis acutis, involucro triphyllo, partiali nullo.
Hiſpaniola, Jamaica.

pauci-

OLYRA.

pauciflora. 2. O. floribus axillaribus.
Gramen floribus axillaribus, foliis ovatis. *Loefl. it. am.* 243. 100.
Jamaica.

paniculata. 1. O. *panicula terminali, culmo ramoſo.* Olyra latifolia. *Linn.*

DIGYNIA.

SACHARUM.

polyſtachyon. 2–3. L. floribus paniculatis, ſpicis filiformibus longiſſimis faſtigiatis, floſculis remotiuſculis. *
St. Chriſtopher.

LEERSIA.

Calyx nullus. *Cor. Gluma* bivalvis, clauſa.
(pone *Sacharum*)

monandra. 2. L. panicula effuſa, ſpicis remotis laxis, ſpiculis ſecundis ſubrotundis monandris, glumis lævibus.
Jamaica.

hexandra. 3. L. panicula effuſa, ſpiculis alternis hexandris, glumis ſublævibus.
Jamaica.

oryzoides. 1. L. *panicula effuſa, ſpiculis triandris, glumarum carinis ciliatis.* Phalaris oryzoides. *Linn.*

PASPATUM.

conjugatum. 7. P. ſpicis duabus horizontalibus conjugatis, ſpiculis ovatis, culmo erecto, foliis involutis. P. conjugatum. *Berg. act. Helv.* 7. 129. t. VIII.
India occidentalis.

vaginatum. 8. P. ſpicis duabus, ſpiculis bifariis acuminatis, culmo ramoſo geniculato, geniculis vaginatis.
Jamaica.

filiforme. 6. P. ſpica ſubſolitaris lineari-ſecunda, ſpiculis alternis ovatis compreſſis, culmo foliisque filiformibus.
Jamaica.

decumbens. 10. P. ſpica unica ſecunda, pedunculis longiſſimis, ſpiculis alternis, orbiculato-acuminatis glabris, culmo procumbente.
Jamaica.

PANICUM.

ſetoſum. 6–7. P. ſpica compoſita, ſpiculis paniculato-faſciculatis, ſetis floſculis immixtis longiſſimis, pedunculis ſubglabris.
Jamaica.

piloſum. 11–12. P. ſpicis paniculatis alternis ſecundis, ſpiculis geminis, altero minore, acuminatis lævibus; rachi compreſſo piloſo, culmo divaricato geniculato.
Milium jamaicenſe polystachion latifolium, ſemine duplicato. *Sloan. h.* 1. *p.* 114.
Jamaica.

molle. 11–12. P. ſpicis paniculatis alternis ſecundis patentibus, ſpiculis approximatis pedicellatis ſecundis muticis.
Panicum 2. *Brown. jam.* 133.
India occidentalis.

faſciculatum. 11–12. P. ſpicis paniculatis alternis erectis, ſubfaſtigiatis, ſpiculis ſecundis ſubrotundis.
Jamaica.

Chartaginenſe. 11–12. P. ſpicis paniculatis, foliis brevioribus, ſpiculis ſecundis ovatis acutis, culmo proſtrato geniculato ramoſiſſimo, vaginis pubeſcentibus.
America meridionalis, Chartagena. ♃.

nemoroſum. 26–27. P. panicula ſimplici, ramis diſtantibus erectis, floſculis remotis ſparſis ovatis acuminatis; culmo decumbente geniculato-vaginis colloque piloſis.
Jamaica, Domingo.

acumi-

acuminatum. 26–27. P. paniculis simplicibus foliis brevioribus, ramis capillaribus diffusis, spiculis remotis obovatis, culmo decumbente geniculato ramoso, foliis lanceolato-subulatis erectis, vaginisque villosis.
Jamaica.

rigens. 26–27. P. panicula simplici rigida patente, culmo ramoso decumbente, foliis horizontalibus scabris.
Jamaica.

fuscum. 26–27. P. panicula simplici, ramis erectis, flosculis secundis geminis, altero brevius pedicellato, culmo erecto subdiviso; foliis lato-lanceolatis.
Jamaica.

laxum. 26–27. P. panicula simplici nutante, ramis capillaribus, spiculis approximatis alternis adpressis, culmo simplici filiformi flaccido, foliis linear-lanceolatis.
Milium. *Sloan. Hist.* 1. 114.
Jamaica.

flavescens. 27–28. P. panicula simplici erecta stricta, ramis subfastigiatis, infimis oppositis, spiculis approximatis secundis, pedicellis bifloris.
Jamaica.

diffusum. 27–28. P. panicula simpliciuscula capillari patenti, spiculis distantibus, culmo decumbente simplici, foliis linearibus, collo pilosis.
Milium jam. anguſtifolium, panicula sparsa. *Sloan. hist.* 1. 114.
Jamaica, Hispaniola.

oryzoides. 27–28. P. panicula subsimplici, ramis erectis, flosculis remotiusculis ovatis acutis, culmo erecto indiviso, foliis lato-lanceolatis basi rotundatis, vaginis lævibus. Milium jamaicense arundinis folio. *Sloan. hist.* 1. *p.* 104.
Jamaica.

pallens. 32–33. P. panicula composita ovata, ramis confertis erectis, spiculis ovatis subulatis, culmo subdiviso geniculato, foliis ovato-lanceolatis, vaginis collo margineque ciliatis.
Apluda Zeugitis. *Aubl. guian.*
Jamaica.

lanatum. 32–33. P. panicula compoſita erecta glabra, ſpiculis ovatis, culmo ramoſo, foliis ovato-lanceolatis pubeſcentibus, vaginis lanuginoſo-hirſutis.
Jamaica.

Arundinaceum. 32–32. P. panicula compoſita patente, ramis ramulisque ſtrictis capillaribus, ſpiculis ſubrotundis, culmo ſubdiviſo geniculato, foliis lato-lanceolatis acuminatis rigidis.
Jamaica.

polygamum. 32–33. P. panicula compoſita capillari patente, floſculis polygamis, culmo articulis hirſutis. Holcus. 2. *Brown. jam.* 366.
India occidentalis. ♃.

glutinoſum. 32–33. P. panicula compoſita patente, ramis flexuoſis, ſpiculis pedicellatis diſtantibus glutinoſis, culmo erecto ſimplici, foliis latioribus. *Sloan.* h. 1. 114. t. 71. *f.* 3.
Jamaica.

trichoides. 33–34. P. panicula ramoſiſſima patente, ramis ramulisque ſubdiviſis capillaribus, culmo declinato geniculato, foliis ovato-lanceolatis glaberrimis. *Sloan.* h. 1. 86. 115. t. 72. f. 3.
Jamaica, Hiſpaniola.

MILIUM.

compreſſum. 4–5. M. ſpicis ſubternis, floſculis alternis muticis rachi adpreſſis, culmo medio articulato-compreſſo, pedunculis longiſſimis.
Jamaica, India occidentalis. ♃.

paniceum. 4–6. M. ſpicis ſubdigitatis alternis approximatis filiformibus; floſculis ſecundis muticis adpreſſis trigonis.
Jamaica.

digitatum. 4–5. M. ſpicis digitatis ſub4-ternis ſubſeſſilibus, floſculis muticis adpreſſis ſecundis, foliis margine cartilagineo-ſerratis.
Jamaica.

villoſum. 9. M. panicula laxa, floſculis muticis, calycibus lanatis. Andropogon inſulare *Linn.*
India occidentalis. ☉.

AGRO-

AGROSTIS.

purpura-ſcens. 24–25. A. panicula contracta elongata, ramis adpreſſis erectis, floſculis inæqualibus acuminatis. Gramen pratenſe panicula & foliis anguſtiſſimis — *Sloan.* h. I. 115.
Jamaica.

MANISURIS.

granularis. 2. M. ſpicis lateralibus, valvulis exterioribus orbiculatis punctato-calloſis, vaginis piloſis; culmo erecto.
Cenchrus granularis. *Linn.*
Gramen Cyperoides — *Sloan. j.* 36. h. I. *p.* 128. *t.* 80. a LINNÆO pro Panico clandeſtino citatum.
Jamaica.

myurus. 1. M. *ſpicis lateralibus, valvulis exterioribus planis ovatis, apice lateribusque emarginatis, culmo adſcendente.* Manisuris myurus. *Linn.*

CHLORIS.

POLYGAM. CAL. *Gluma communis* 2-valvis 2-flora, floſculo hermaphrodito ſeſſili.
☿ *Cal.* O. *Cor. Gluma* 2-valvis, ariſta terminali.
♂ *Cal.* O. *Cor. Gluma.* 1-valvis ariſtata.

cruciata. 1. C. ſpicis ſubquaternis cruciatis, floſculis acuminatis. Agroſtis cruciata *Linn.*
Jamaica.

ciliata. 2. C. ſpicis digitatis ſubqvinis; glumis corollinis margine ciliatis.
Jamaica.

petræa. 3. C. ſpicis quaternis ſtrictis erectiusculis, ſpiculis confertis glabris muticis, culmo compreſſo.
Jamaica.

polydactyla. 4. C. spicis plurimis fasciculatis laxis, glumis corollinis margine ciliato-villosis.
Andropogon polydactylon. *Linn.*
Jamaica.

radiata. 5. C. spicis (subsenis) plurimis fasciculatis erectiusculis, flosculis subulatis aristatis glabris.
Agrostis radiata *Linn.*
Andropogon fasciculatum *Linn.*
India occidentalis.

ANDROPOGON.

sacharoides. 5–6. A. paniculæ ramis simplicibus, floscu'is geminis, hermaphrodito aristato sessili, altero mutico pedicellato tabescente, pedicellis rachisque lanatis.
Jamaica.

fastigiatum. 12–13. A. paniculæ spicis solitariis, pedunculis elongatis, subfastigiatis, rachi lanata, flosculis aristatis, masculo sertili.
Jamaica.

brevifolium. 23.– A. spicis lateralibus solitariis, floscu'is alternis remotis aristatis, culmo geniculato compresso.
Jamaica.

CENCHRUS.

setosus. 4–5. C. spica lineari-oblonga, involucris setosis, setis inermibus, interioribus basi villosis, villis ciliatis, glumis lævibus.
India occidentalis.

POA.

glutinosa. 8–9. P. panicula patente stricta, spiculis subnovemfloris hirsutiusculis glutinosis, culmo simplici, foliis subpilosis. *Sloan.* h. 114. t. 71. *f.* 2.
Jamaica.

poli-

prolifera. 8–9. P. panicula patente ſtricta, ſpiculis multifloris, (18—20) culmo ramoſiſſimo nodoſo, ad nodos prolifero. *.
Inſulæ caribæa.

PICRAMNIA.

DIOIC. ♂. *Calyx* tripartitus.
Cor. tripetala
♀. *Cal. Cor.* maris.
Bacca bilocularis.
(poſt *Oſbridem*).

Antideſma. 1. PICRAMNIA.
Antideſma. *Brown. jam.* 123. Berberis fruticoſa, racemoſa, fraxini-folio alato, fructu nigro dipyreno. *Sloan.* h. 2. 101. t. 209. *f.* 2.
Jamaica, Domingo. ♄.

TRIGYNIA.

HOLOSTEUM.

diandrum. 1–2. H. caulibus procumbentibus rigidioribus, foliis ſubrotundis, floribus diandris.
Jamaica. ☉.

PHYLLANTHUS.

nutans. 1–2. P. fruticoſa, foliis alternis ovalibus ſubtus glaucis; racemis terminalibus folioſis nutantibus. Tilia forte arbor racemoſa, folio longiore ſubtus albicante. *Sloan.* h. 2. 19. t. 158. *f.* 3.
Jamaica. ♄.

mimoſoides. 1–2. P. caule fruticoſo, ramis virgatis, foliis pinnatis floriferis. *
Antigua. ♄.

Conami-

Conami. 1-2. P. caule fruticoso ramosissimo, ramis diffusis, foliis petiolatis subrotundis, apice attenuatis obtusiusculis, pedunculis fasciculatis axillaribus.
Conami brasiliensis. *Aubl. guian.* 926. t. 354.
India occidentalis. ♄.

XYLOPHYLLA.

arbuscula. 2. X. foliis pinnatis lanceolatis acuminatis subcrenatis coriaceis, floribus pedunculatis triandris monoicis.
Jamaica. ♄.

falcata. 3. X. foliis sparsis lineari-lanceolatis subfalcatis crenatis, floribus subsessilibus triandris monoicis. * *Pluk. ph.* t. 247. 4.
Synon. et figur. Commelin. Catesb. Sebæ.
Bahama. ♄

anguſtifolia. 4. X. foliis pinnatis lineari-lanceolatis lineatis crenatis, floribus pedunculatis hermaphroditis. Phyllanthus 2. *Brown. jam.* 188.
Jamaica. ♄.

linearis. b. foliis linearibus lineatis, floribus albis.

montana. 5. X. foliis distichis lato-lanceolatis incisocrenatis; ramis apice ancipitibus, floribus sessilibus.
Jamaica. ♄.

latifolia. 1. X. *foliis pinnatis lato-lanceolatis crenatis; floribus pedunculatis hermaphroditis hexandris, femineisque mixtis.* X. latifolia. *Linn.*

CLAS-

CLASSIS IV.

TETRANDRIA.

MONOGYNIA.

ERNODEA. (XLVII. æ.)

Cor. 1 petala, hypocrateriformis.
Cal. 4-partitus.
Bacca 2-lociulariss. *Sem.* solitaria.
(pone *Pauertam.*)

littoralis. 1. ERNODEA. Knoxia 1. *Brown. jam.* 140. Thymelæa — *Sloan.* j. 168. h. 2. p. 93. l. 189. f. 1. 2.
Jamaica ♄.

HEDYOTIS.

rupestris. 7. H. foliis 4-fariis subulatis canaliculatis, floribus sessilibus axillaribus, corollis villosis tubo curvo. Hedyotis americana. *Jacq. am.* p. 20.
Thymelæa &c. *Sloan.* h. 2. p. 94. *l.* 202. *f.* 1.
India occidentalis. ♄.

SPERMACOCE.

villosa. 3-4. S. villosa, simplex, foliis ovato-lanceolatis pubescentibus, summis qvaternis, floribus verticillatis, staminibus inclusis.
Pulegium &c. *Sloan.* cat. 64.
Jamaica. ☉.

DIODIA.

simplex. 2. D. caule herbaceo simplici erectiusculo lævi, foliis ovato-lanceolatis.
Jamaica.

pro-

proſtrata. 3 D. caule ſuffruticoſo ſubdiviſo, ramis proſtratis filiformibus, foliis linearibus hirſutiuſculis revolutis. Diodioides *Loeſl. it.* 201. *Jamaica.*

ſcandens. 4. D. caule ſcandenti ſuffruticoſo, foliis ovato-lanceolatis rigidis ſcabris. *Hiſpaniola.* ♄.

ſarmentoſa. 5. D. caule flaccido fruticoſo, ramis oppoſitis patentibus, foliis oblongis acutis ſcabriuſculis. *Jamaica.* ♄.

CATESBAEA.

parviflora. 2. C. corollis tubo tetragono abbreviato, baccis ſubrotundis. *Jamaica.* ♄.

longiflora. 1. C. *corollis tubo longiſſimo, baccis ovalibus.* C. ſpinoſa *Linn.*

IXORA.

faſciculata. 3. I. foliis ovato-ellipticis, ramulorum ſubfaſciculatis pedunculis filiformibus ſub 3-floris.* *Jamaica.* ♄.

multiflora. 4. I. ? foliis lanceolato-ovatis faſciculatis, pedunculis aggregatis unifloris breviſſimis, baccis monoſpermis. ♄. *Jamaica.*

HOFFMANNIA.

Calyx. 4-dentatus
Corolla hypocraterif. 4-partita.
Filamenta nulla.
Bacca bilocularis, polyſperma.
(poſt *Peteſiam*).

pedunculata. 1. HOFFMANNIA. *Jamaica.*

COC-

COCCOSIPSILUM. (Browne)

Calyx quadripartitus, ſuperus.
Corolla infundibuliformis.
Bacca inflata, 2-locularis, polysperma.
(inter *Mitchellam* et *Callicarpam.*)

repens. 1. COCCOSIPSILUM. *Brown. jam.* 144.
Jamaica.

WALLENIA.

Calyx quadrifidus, inferus.
Corolla tubuloſa, 4-fida.
Bacca 1-ſperma.
(ante *Callicarpam*).

laurifolia. 1. WALLENIA.
Peteſioides laurifolium. *Jacq. am.* 17.
Bryonia nigra fruticoſa, foliis laurinis.
Sloan. h. 2. 234. *t.* 145. *f.* 5.
Jamaica, Hiſpaniola. ♄.

CALLICARPA.

ferruginea. 1–2. C. foliis lato-lanceolatis ſerratis ſubtus ſcabriuſculis, cymis terminalibus axillaribusque.
Jamaica. ♄.

reticulata 1–2. C. foliis elliptico-lanceolatis ſubſerratis rugoſis, ſubtus tomentoſo incanis. *
Jamaica. ♄.

AEEGIPHILA.

elata. 2. Æ. foliis ellipticis acuminatis membranaceis, paniculis terminalibus, calycibus pubeſcentibus.
Knoxia 2. *Brown. jam.* 140.
India occidentalis. ♄

foetida.

foetida. 3. Æ. foliis ouato-lanceolatis, subtus petiolisque hirsutis, pedunculis axillaribus, solitariis. *Jamaica.* ♄.

trifida. 4. Æ. foliis ovato-lanceolatis glabris, pedunculis axillaribus trifidis confertis. *Jamaica.* ♄.

SAMARA.

coriacea. 2. S. floribus sessilibus conglomeratis, foliis lanceolato-ovatis acutis subcoriaceis. *Jamaica.* ♄.

LABATIA.

Calyx 4-phyllus, inferus.
Corolla subcampanulata, 4-fida.
Laciniæ 2 minutæ in divisuris corollæ.
Capsula 4-locularis.
Sem. solitaria.
(inter *Blæriam* & *Budlæam.*)

sessiliflora. 1. LABATIA. *Hispaniola.* ♄.

VISCUM.

flavens. 6–7. V. foliis ouatis venosis, racemis axillaribus utrinque ternis, 4-ternisque.
Viscum aliud racemosum, foliis latissimis. *Plum. ic.* 256. t. 258. f. 4.
Viscum racemosum. *Aubl. gvian.* 895. 4.
India occidentalis. ♄.

POTHOS.

violacea. 3–4. P. foliis ovato-lanceolatis integris nervosis punctatis. Arum 13. *Brown. jam.* 333.
Dracontium scandens. *Aubl. gvian.* 836. 3.
Jamaica, India occidentalis. ♃.

marcre-

macrophylla. 5–6. P. foliis cordatis, ſpadice longiſſima, radice nodoſa.
Dracontium amplis foliis cordatis, radice nodoſa rubra. *Plum. fil.* t. 63.
Dracontium cordatum. *Aubl. gvian.* 836. 3.
India occidentalis. ♃.

AMMANNIA.

ſanguinolenta. 3–4. A. foliis ſemiamplexicaulibus, baſi cordatis, floribus ſubpedunculatis, octandris petaligeris.
Jamaica, Domingo.

FAGARA.

trifoliata. 1–2. F. foliis ternatis foliolis obovatis ſubemarginatis integris nitidis ſubtus punctatis. *
Dominica. ♄.

emarginata. 5. F. foliis pinnatis, foliolis ovatis emarginatis venoſis, racemis terminalibus compoſitis, floribus triandris.
Lauro affinis therebinthi folio alato ligno odorato candido. *Sloan.* h. 2. 24. t. 168. f. 4.
Jamaica. ♄

ſpinoſa. 5. F. foliis pinnatis ſeſſilibus ovatis acuminatis ſubtus ramisque ſpinoſis, floribus 3–andris.
Jamaica. ♄.

acuminata. 5. F. foliis pinnatis, foliolis integris ellipticis acuminatis nitidis coriaceis, floribus cymoſis 3–andris. *.
Jamaica. ♄.

LUDWIGIA.

repens. 2–3. L. foliis oppoſitis ovatis, pedunculis ſolitariis axillaribus, caule repente.
Jamaica. ☉.

DORSTENIA.

cordifolia. 1–2. D. scapis radicatis, foliis cordatis ovatis denticulatis, receptaculis orbiculatis.
D. cordifolia *Lamark Encycl.* 2. p. 317. 2.
Jamaica, domingo. ♃.

BOEHMERIA. Jacq. (LIII.)

MONOIC. ♂. *Cal.* 4-partitus. *Cor.* O.
♀. *Calyx* nullus, sed squamæ confertæ, inter quas singulas:
Germen obovatum.
Stylus unicus.
Semen unicum, compressum.
(ante *Urticam*).

caudata. 1. B. foliis oppositis ovatis acutis serratis, racemis longissimis pendulis, floribus dioicis, caule suffruticoso.
Urtica. 11. *Brown. jam.* 337.
Jamaica. ♄.

littoralis. 2. B. foliis oppositis ovato-lanceolatis serratis, floribus conglomeratis axillaribus monoicis mixtis, caule herbaceo tetragono.
Hispaniola.

cylindrica. 3. B. foliis oppositis ovatis acuminatis serratis, racemis spicatis axillaribus erectis simplicibus. Urtica cylindrica *Linn.*

ramiflora. 4. B. foliis alternis lato-lanceolatis acuminatis serratis rugosis, floribus aggregatis axillaribus lateralibusque monoicis distinctis, masculis triandris.
B. ramiflora. *Jacq. am.* 246. t. 137.
Caturus ramiflorus. *Linn.* Urtica 10. *Brown. jam.* 337.
India occidentalis ♃.

hirta. 5. B. foliis alternis ovatis acutis serratis hirsutis, floribus monoicis congestis axillaribus mixtis.
Jamaica.

URTI-

URTICA.

* *Foliis oppositis.*

reticulata. 5–6. U. foliis oppositis oblongis acutis subtus reticulatis, stipulis ovatis integris, racemis paniculatis, foliis brevioribus.
Act. Holm. Tom. VI. 1. 30.—VIII. 1. 70.
Jamaica.

laxa. 6–7. U. foliis oppos. ovatis acuminatis serratis; floribus dioicis, masculis pedunculatis confertis, femineis racemosis, caule laxo.
Act. Holm. t. VIII. 1. 58.
Hispaniola.

Betulæfolia. 6–7. U. foliis oppos. cordato-subrotundis serratis, stipulis integris, floribus racemosis, caule prostrato adscendente.
Act. Holm. t. VIII. 1. 59.
Hispaniola.

diffusa. 6–7. U. foliis oppos. ovatis acute serratis hispidis, stipulis revolutis, racemis paniculatis foliis longioribus; caulibus procumbentibus.
Act. Holm. t. VI. 1. 30.
Jamaica.

rufa. 6–7. U. hirsuta tota; foliis oppos. oblongis serratis, stipulis subrotundis persistentibus; racemis terminalibus, caule suffrutescente ramoso. *Act. Holm.* t. VIII. 1. 59.
Jamaica.

rugosa. 7–8. U. fol. oppos. oblongis serratis nervosis rugosis, racemulis terminalibus dioicis; caule simplici erecto. *Act. Holm.* t. VIII. 1. 60.
Hispaniola.

repens. 7–8. U. foliis oppos. ovalibus monoicis, caule simplici repente. *Act. Holm.* t. VIII. 1. 61.
Hispaniola.

nudicaulis. 9–10. U. foliis subterminalibus oppositis oblongis acuminatis integris trinerviis; caule angulosо, inferne nudo racemifero, floribus dioicis.
Act. Holm. t. VI. 1. 36. VIII. 1. 71.
Jamaica.

ſtolonifera. 9–10. U. ſubcauleſcens, foliis oppoſitis oblongis ſubſerratis, floribus dioicis, ſtolonibus radicalibus. *Act. Holm.* t. VIII. 1. 62.
Hiſpaniola.

ciliata. 11–12. U. foliis oppoſ. ovatis ciliatis ſerratis, floribus terminalibus aggregatis ſubpedunculatis monoicis; caule divaricato. *Act. Holm.* t. VI. 1. 32.
Jamaica.

radicans. 11–12. U. foliis oppoſ. cuneato-ovatis crenatis nitidis, floribus axillaribus ſubſeſſilibus, caule ramisque radicantibus. *Act. Holm.* t. VI. 1. 29. t. VIII. 1. 71.
Jamaica.

nummularifolia. 12–13. U. foliis oppoſ. orbiculatis crenatis hirſutis, floribus terminalibus confertis monoicis; caule filiformi ſimplici repente. *Act. Holm.* t. VIII. 1. 63. tab. 1. f. 2.
Nummularia ſaxatilis minima repens, floribus albis, fol. crenatis villoſis. *Sloan. H.* 1. 206. t. 131. f. 4.
Jamaica.

depreſſa. 12–13. U. foliis oppoſ. ſubrotundis crenatis glabris; floribus terminalibus confertis, caule repente ſubdiviſo. *Act. Holm.* t. VIII. 1. 64.
Jamaica.

herniarioides. 12–13. U. foliis oppoſ. ſubrotundis integris terminalibus qvaternis, floribus monoicis diſtinctis; caule filiformi diffuſo. *Act. Holm.* t. VIII. 1. 64. tab. 2. f. 1.
Hiſpaniola. ☉.

ſerrulata. 12–13. U. foliis oppoſitis lanceolatis ſerratis glabris, pedunculis axillaribus foliis brevioribus, floribus capitellatis monoicis; caule fruteſcente tetragono. *Act. Holm.* t. VIII. 1. 65.
Jamaica. ♄.

lucida. 12–13. U. foliis oppoſ. ſemipinnatis nitidis, pedunculis axillaribus folio longioribus, floribus capitellatis; caule fruteſcente angulato. *Act. Holm.* t. VI. 1. 31. VIII. 1. 70.
Jamaica. ♄.

micro-

micro-phylla. 12–13. U. foliis ovatis acutis integerrimis, minoribus ovatis oppositis et intermixtis, floribus dioicis; caulibus simpliciusculis adscendentibus. Parietaria microphylla *Linn. Act. Holm.* VIII. 1. 60.

trianthe-moides. 12–13. U. foliis oppos. oblongis integerrimis, alternis majoribus, floribus monoicis, caule erecto ramoso. *Act. Holm.* VIII. 1. 68. *Hispaniola.*

cuneifo-lia. 12–13. U. foliis oppos. cuneatis obovatis apice dentatis, alternis majoribus; racemulis pedunculatis, floribus monoicis.
U. crenulata. *Act. Holm.* VI. 1. 35. VIII. 1. 70. *Jamaica.*

** *Foliis alternis.*

lappula-cea. 12–13. U. foliis alternis ovatis scabriusculis, floribus terminalibus subsessilibus monoicis, seminibus trigonis; caule diffuso.
U. humilis. *Act. Holm.* VI. 1. 34. VIII. 1. 69. tab. 2. f. 2.
Jamaica, Domingo.

sessiliflo-ra. 13–14. U. foliis alternis lanceolato-ovatis crenatis, racemis brevissimis axillaribus, floribus monoicis distinctis; caule erecto. l. c. VI. 1. 33. *Jamaica.*

elata. 15–16. U. foliis alternis ovatis acutis serratis, caule arboreo, ramis nudiusculis racemiferis, floribus dioicis.
Jamaica.

MANETTIA.

Lygistum. 2. M. foliis ovatis acutis venosis, caule volubili suffruteseente. Petesia Lygistum. *Linn.* Lygistum. *Brown. jam.* 142. t. 3. f. 2.
Jamaica.

reclinata. 1. M. *foliis ovatis acutis pubescentibus, caule reclinato herbaceo.* M. reclinata. *Linn.*

ALCHEMILLA.

monandria. 1–2. A. foliis tripartito trifidis birsutis; floribus monandris confertis axillaribus.

DIGYNIA.

SCHÆFFERIA. Jacq.

DIOIC. ♂. *Calyx* 4-5 phyllus.
Cor. 4-petala aut nulla.
♀. *Calyx* 4-5-partitus.
Cor. 4 petala aut nulla.
Bacca 2-locularis.
Sem. solitaria.

completa. 1. S. floribus 4-petalis axillaribus. Schæfferia frutescens. *Jacq. am.* 259.
Buxi folio majore acuminato, arbor baccifera, fructu minore crocco dipyreno. *Sloan.* h. 102. t. 209. f. 1.
India occidentalis. ♄.

lateriflora. 2. L. floribus lateralibus apetalis.
Hispaniola. ♄.

TRIGYNIA.

CRANTZIA. (XLIV.)

MONOIC. ♂. *Calyx* 4-phyllus.
Cor. O. *Filamenta* ovata.
♀. *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* O.
Styli conici.
Capsula 3-cornis, 3-locularis.
Sem. bina.
(inter *Littorellam* et *Ciccam.*)

lævigata. 1. CRANTZIA.
Jamaica. ♄.

ARGY-

ARGYTHAMNIA. (XXXVIII.)

MONOIC. ♂. *Calyx* 4-phyllus.
Corolla 4-petala.
♀. *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* O.
Styli dichotomi.
Capsula 3-cocca. *Sem.* solitaria.
(post *Ciccam.*)

candicans. 1. ARGYTHAMNIA. *Brown. jam.* 338. Ricino affinis odorifera fruticola minor &c. *Sloan.* h. 2. 132. t. 86. 3.
Jamaica. ♄.

TETRAGYNIA.

MYGINDA.

Rhacoma. 2. M. foliis lanceolato-ovatis obtusis crenatis, floribus monogynis, stylo 4-fido.
Rhacoma crossopetalum *Linn.*

latifolia. 3. M. foliis ellipticis crenulatis coriaceis, floribus stigmatibus 2 4 sessilibus.
India occidentalis. ♄.

uragoga. 1. M. *foliis subcordatis acuminatis subserratis pubescentibus.* M. uragoga *Linn. Jacq.*

CLASSIS V.

PENTANDRIA.

MONOGYNIA.

HELIOTROPIUM.

inundatum. 3-4. H. foliis oblongis obtusis hirsutis, spicis quaternis erectis; caule frutescente.
Insulæ caribææ. *

ANAGALLIS.

pumila. 1-2. A. caule erecto, foliis subrotundis acutis sessilibus.
Jamaica. ☉.

TOURNEFORTIA.

bicolor. 4-6. T. foliis ovatis acuminatis glabris, superne rugosiusculis; spicis cymosis erectis recurvis.
Jamaica. ♄.

LISIANTHUS.

exsertus. 5. L. foliis ovato-lanceolatis, pedunculis trichotomis, genitalibus longissimis.
Jamaica. ♄.

latifolius. 6. L. foliis lanceolato-ellipticis acuminatis, pedunculis trichotomis, laciniis corollæ erectis, genitalibus inclusis.
Jamaica. ♄.

umbellatus. 7. L. foliis elongatis obovatis, floribus terminalibus pedunculatis umbellatis, laciniis corollæ brevissimis obtusis erectis.
Jamaica. ♄.

frigidus. 8. L. foliis ovatis acuminatis coriaceis, panicula terminali trichotoma, corollis ventricosis, laciniis subrotundis. *
Guadeloupe montes. ♄.

RON.

RONDELETIA.

* *Sem. plura.*

piloſa. 3–4. R. foliis petiolatis ovatis utrinque piloſis, pedunculis axillaribus foliis brevioribus 3-fidis, floribus tetrandris. *
Jamaica. ♄.

virgata. 3–4. R. foliis petiolatis cordatis ſubrotundis, ramis lateralibus filiformibus patentibus floriferis apice trifidis, floribus confertis tetrandris.
Hiſpaniola. ♄.

** *Sem. ſubſolitaria.*

thyrſoidea. 3–4. R. foliis oblongis membranaceis, ſubtus pubeſcentibus, thyrſis lateralibus.
Jamaica. ♄.

tomentoſa. 3–4. R. foliis ovatis acuminatis tomentoſis, pedunculis tripartitis axillaribus brevibus.
Peteſia 3. *Brown. jam.* 144.
Jamaica. ♄.

umbellulata. 3–4. R. foliis lanceolato-ovatis, ſub-hirſutis, pedunculis axillaribus ſolitariis, apice trichotomis, floribus confertis.
Jamaica. ♄.

incana. 3–4. R. foliis ovato-lanceolatis, ſubtus incanis ſcabris; pedunculis axillaribus ſimplicibus trifloris.
Jamaica. ♄.

hirſuta. 3–4. R. foliis ovatis acutis hirſutis, pedunculis axillaribus trichotomis laxis, floribus hirſutis.
Jamaica. ♄.

hirta. 3–4. R. foliis ellipticis acuminatis hirtis nervoſis, ſubtus piloſis rigidis, pedunculis axillaribus 3-partitis erectis. *
Jamaica. ♄.

CINCHONA.

floribunda. 4. C. floribus paniculatis glabris, capſulis turbinatis lævibus, foliis ellipticis acuminatis glabris. *Kinkina Piton.* Gall. *Act. Nat. curioſor.* 1787.
St. Lucia, Martinica, Hiſpaniola. ♄.

brachycarpa. 5. C. floribus paniculatis glabris, capsulis ovatis costatis; foliis ellipticis obtusis glabris. ✻ *Jamaica.* ♄.

angustifolia. 6. C. floribus paniculatis glabris, capsulis oblongis pentagonis, foliis lineari-lanceolatis pubescentibus. *Act. Stockh.* 1787. VIII. 2. 117. *tab.* III. *Hispaniola.* ♄.

BELLONIA.

spinosa. 2. B. spinosa, foliis ovatis angulatis, dentato-serratis, pedunculis axillaribus unifloris. *Hispaniola.* ♄.

aspera. 1. B. *foliis ovatis serratis, floribus corymbosis terminalibus. Plum. Linn.*

PORTLANDIA.

coccinea. 1–2. P. floribus pentandris, foliis ellipticis coriaceis. *Jamaica.* ♄.

SOLANDRA. (XL.)

Cor. infundibuliformis, maxima.
Cal. rumpens.
Stam. inclinata.
Bacca supera 4-locularis polysperma.
(pone *Portlandiam.*)

grandiflora. 1. SOLANDRA.
Act. Stockh. VIII. 4. 300. tab. XI.
Stramonium scandens flore luteo. *Plum. fig.*
Jamaica. ♄.

PSYCHOTRIA.

hirsuta. P. stipulis lanceolatis integris deciduis, foliis ovato-lanceolatis hirsutis, caule hirsutissimo, panicula patente.
Jamaica. ♄.

glabra-

glabrata. P. ſtipulis indiviſis deciduis, foliis ovatis glaberrimis nitidis, floribus paniculatis erectis.
Jamaica. ♄.

Laurifolia. P. ſtipulis ovatis acuminatis deciduis, foliis ovato-lanceolatis craſſiuſculis glabris, paniculis erectis, baccis ſubrotundis.
Hiſpaniola. ♄.

Citrifolia. P. ſtipulis ovatis perſiſtentibus, foliis ellipticis acuminatis glaberrimis ſubcoriaceis; paniculis foliis brevioribus, baccis oblongis coſtatis.*
India occidentalis. ♄.

tenuifolia. P. ſtipulis ovatis apice 2-fidis deciduis, foliis oblongis acutis tenuioribus glabris; paniculis erectis.
Hiſpaniola. ♄.

nervoſa. P. ſtipulis ovatis emarginatis deciduis, foliis ovatis acuminatis nervoſis ſubundulatis, paniculis erectis.
P. chartaginenſis? *Jacqu. am.* 65. t. 174. f. 22.
Jamaica. ♄.

foetens. P. ſtipulis acuminatis integris deciduis, foliis lanceolato ovatis glabris, panicula patentiſſima, pedunculis reflexis filiformibus.
Jamaica. ♄.

marginata. P. ſtipulis integris acuminatis, foliis lanceolato-ovatis, margine cartilagineo-ſetoſis; paniculis laxis.
Pſychotrophum 6. *Brown. jam.* 161.
Jamaica. ♄.

grandis. P. ſtipulis triangularibus revolutis, apicibus convolutis ſubulatis; foliis cuneiformibus obovatis, caule angulato ſuffrutescente.
Jamaica, Domingo. ♄.

uliginoſa. P. ſtipulis connatis acutis convexis; foliis lanceolato ovatis, ſeminibus compreſſis criſtatis, caule ſubherbaceo erecto.
Pſychotrophum. 1. *Brown. jam.* 160.
Jamaica.

nutans. P. ſtipulis geminis ſubulatis, foliis lanceolatis acutis nervoſis, floribus cymoſis, baccis nutantibus.
Hiſpaniola. ♄.

horizon-

horizontalis. P. ſtipulis ovatis, foliis lanceolato-ovatis acutis, ramis foliisque horizontalibus, floribus paniculatis.
Hiſpaniola. ♄.

parviflora. P. ſtipulis amplexicaulibus integris, foliis ellipticis coriaceo-ſubſucculentis, cymis pedunculatis trichotomis, longitudine foliorum. * Viſcoides pendulum *Jacq. am.* 73. t. 51. f. 1.
India occidentalis, Montſerrat. &c. ♄.

myrſtiphyllum. P. exſtipulata, foliis lanceolato-ovatis integris nitidis rigidis, ramis ſecundis, floribus paniculatis. Myrstiphyllum *Brown. jam.* 152. *Sloan.* h. 2. 102. t. 209. f. 2.
Jamaica ♄.

pubeſcens. P. ſtipulis geminis ſubulatis, foliis ovato-lanceolatis pubeſcentibus, paniculis erectis, corollis cylindricis. Pſycotrophum 5. *Brown. jam.* 161.
Jamaica, Hiſpaniola. ♄.

pedunculata. P. ſtipulis bidentatis, foliis ovato-lanceolatis rugoſis, floribus cymoſis, pedunculis elongatis. Pſycotrophum 4. *Brown. jam.* 160.
Jamaica. ♄.

crocea. P. ſtipulis geminis ſubulatis, foliis ovatis nervoſis, panicula erecta terminali crocea, pedunculis coloratis. Pſychotrophum 2. *Brown. jam.* 160. t. 13. f. 2, 1.
Jamaica, Hiſpaniola. ♄.

alpina. P. ſtipulis truncatis bidentatis, foliis membranaceis multinerviis, panicula erecta, corollis cylindricis elongatis diaphanis.
Chiococca paniculata *Linn. ſuppl.* ?
Jamaica. ♄.

corymboſa. P. ſtipulis geminis acutis, foliis ovato-lanceolatis conſiſtentibus nitidis; floribus erectis cylindraceis; baccis corymboſis, pedunculis coloratis.
Jamaica. ♄.

patens.

patens. P. ſtipulis geminis ſubulatis, foliis diſtichis ovato-lanceolatis membranaceis, ramis patentibus, paniculâ ſecunda. Nonatelia paniculata. *Aubl. gvian.* 184. tab. 70. f. 2.?
Jamaica. ♄.

brachiata. P. ſtipulis ovatis biſidis, racemis brachiatis, floribus terminalibus aggregatis ſeſſilibus.
Jamaica. ♄.

involucrata. P. ſtipulis utrinque bidentatis, foliis ovato-lanceolatis glaberrimis, pedunculis trifloris terminalibus, floribus involucratis, involucro 3-phyllo. * Nonatelia officinalis. *Aubl. gvian.* 182. t. 70. f. 1.
India occidentalis. ♄.

Pavetta. P. ſtipulis ſubulatis deciduis, ramis paniculæ brachiatis trichotomis, corollis tubo longiori, laciniis patentibus. Lonicera foliis lanceolato-ovatis. *Plum. ic.* t. 156. f. 1. Ceraſo affinis arbor baccifera, fructu cæruleo teſticulato. *Sloan.* h. 2. 96. t. 189. f. 4.
India occidentalis. ♄.

CEPHAELIS. (XLVIII. d.)

Flores capitati involucrati.
Corolla tubuloſa.
Stigma 2-partitum.
Bacca biſperma.
Receptaculum paleaceum.
(inter *Morindam* & *Conocarpum.*)

violacea. 1. C. capitulis globoſis terminalibus, involucro 5-phyllo, foliis nervoſis glabris.
Tapogomea violacea. *Aubl. gvian.* 157. t. 60.
India occidentalis. ♄.

elata. 2. C. capitulis globoſis terminalibus, pedunculis elongatis, involucro diphyllo, foliis glabris.
Jamaica. ♄.

axillaris. 3. C. capitulis axillaribus ſeſſilibus. *
St. *Chriſtopher.* ♄.

muſcoſa

muſcoſa. 4. C. capitulis ſubrotundis ſubſeſſilibus terminalibus, paleis dentatis. Moriada muſcoſa *Jacq. amer.* 65. t. 45.
India occidentalis. ♄

HAMELLIA.

axillaris. 2. H. ſubherbacea, racemis axillaribus, floribus ſubſecundis ſeſſilibus, foliis ovato lanceolatis.
Jamaica, Hiſpaniola.

Chryſantha. 3. H. racemis terminalibus, foliis oblongis cuneatis acuminatis glaberrimis, floribus pedicellatis. Campanula 2. *Brown. jam.* 166. t. 14. f. 1.
Lonicera. *Plum.* ic. 218. f. 1.
Jamaica. ♄

ventricoſa. 4. H. racemis terminalibus axillaribusque, corollis campanulatis ventricoſis, foliis ternatis. Campanula 1. *Brown. jam.* 166.
Jamaica. ♄.

coccinea. 1. H. racemis terminalibus coloratis, foliis ternatis villoſo-pubeſcentibus.
H. patens. *Linn.*? *Jacq. am.* 72. t. 50.
Lonicera. *Plum. ic.* 218. f. 2.
Hiſpaniola. ♄.

SABICEA. Aublet (XLI. b.)

Involucrum 4- fidum.
Corolla infundibuliformis.
Stigma 5-partitum.
Bacca 5-locularis, polyſperma.
(poſt *Hamelliam.*)

hirta. 1. S. foliis ovato lanceolatis acuminatis hirſutis, floribus pedunculatis.
Jamaica. ♄.

cinerea. 2. S. foliis ellipticis acutis tomentoſis ſubtus incanis, floribus ſubſeſſilibus. *
Sabicea cinerea *Aubl. guian.* 192. tab. 75.
India occidentalis. ♄

SOLA.

SOLANUM.

subinerme. 9–10. S. caule subinermi fruticoso, foliis ellipticolanceolatis integris, supra glabris subtus incano-tomentosis. *Jacq. am.* 50.
S. laurifolium *Mill. dict.*
India occidentalis. ♄.

torvum. 26–27. S. caule aculeato fruticoso, aculeis curvis; foliis cordatis ovatis sinuatis tomentosis, rachibus aculeatis, calycibus inermibus.
Solanum Indicum. *Spec. pl.* 1.
India occidentalis. ♄.

scandens. 26–27. S. caule aculeato fruticoso scandente, foliis angulatis, petiolis, rachibus calycibusque aculeatis, racemis laxis.
Hispaniola. ♄.

JAQUINIA.

venosa. 1–2. I. foliis ovato-lanceolatis venosis submembranaceis. *
India occidentalis. ♄.

CORDIA.

micranthus. 5–6. C. foliis ellipticis lanceolatis integerrimis membranaceis venosis, racemis compositis laxis.
India occidentalis., *Jamaica.* ♄.

elliptica. 5–6. C. foliis ellipticis acuminatis integris coriaceis, ramis compositis diffusis; drupis acuminatis.
Jamaica. ♄.

EHRETIA.

virgata. 3–4. E. foliis oblongis integris superne scabris, ramis filiformibus, floribus terminalibus sparsis, calycibus hirsutis.
Hispaniola. ♄.

VAR-

VARRONIA.

mirabilloides. 2–3. V. foliis ovatis rugosis serratis, floribus racemosis secundis, corollis hypocrateriformibus. V. Mirabilloides. *Jacq. am.* 41. t. 33. *Hispaniola.* ♄.

ARDISIA.

Calyx 5-phyllus.
Cor. reflexa. *Stigma* simplex.
Drupa monosperma.
(inter *Varroniam* & *Laugeriam.*)

Tinifolia. 1. A. floribus paniculatis, foliis ellipticis integris nervosis, caule arboreo.
Jasminum forte arboreum, foliis laurinis obtusis. *Sloan.* h. 2. p. 98. t. 205.

coriacea. 2. A. floribus paniculatis, foliis oblongis integris aveniis coriaceis.
India occidentalis. ♄.

serrulata. 3. A. floribus paniculatis, foliis ovato-lanceolatis acuminatis rugosis, caule fruticoso pubescente.
Domingo. ♄.

lateriflora. 4. A. racemis lateralibus axillaribusve compositis, floribus umbellatis, foliis oblongis acuminatis integerrimis, caule fruticoso.*
India occidentalis. ♄.

parasitica. 5. A. racemis axillaribus simplicibus, foliis sessilibus, lanceolato-ovatis lineatis, caule fruticoso.*
Montserrat. ♄.

LAUGERIA.

lucida. 2. L. foliis oblongis obtusis integris membranaceis nitidis, racemis dichotomis, drupis nucibus biloculatibus. *Locfl. it.* 270. n. 154.
India occidentalis, Jamaica. ♄.

tomentosa. 3. L. foliis ovatis acutis integris subtus tomentosis, racemis dichotomis, drupis nuce biloculari.
Jamaica. ♄.

odora.

odorata. 1. L. *foliis subovatis acutis glabris, caule subspinoso; racemis paniculatis, drupis nucibus 5-locularibus. Linn. Jacqu.*

CESTRUM.

hirtum. 5. C. floribus subspicatis axillaribus; foliis subcordatis ovatis acutis, subtus ramulisque hirtis.
India Occidentalis, Jamaica. ♄.

CHRYSOPHYLLUM.

monopyrenum. 1–2. C. foliis ellipticis acuminatis, subtus tomentoso-aureis, fructu ovato monospermo. Chrysophyllum 2. *Brown. jam.* 171.
India occidentalis. ♄.

microcarpum. 1–2. C. foliis ovatis glabris, subtus pubescentibus, baccis obliquis oblongis monospermis.
Hispaniola. ♄.

rugosum. 2–3. C. foliis oblongis acuminatis utrinque glabris, fructu acuminato rugoso.
Jamaica. ♄.

BUMELIA. (XLIII.)

Cor. 5-fida: *Nectario* 5-phyllo.
Drupa 1-sperma.

(pone *Sideroxylon.*)

nigra. 1. B. ramis virgatis patentibus, foliis terminalibus oblongo-lanceolatis glabris, margine undulatis, ramulis floriferis. Achras 6. *Brown. jam.* 201.
Jamaica. ♄.

pallida. 2 B. ramis erectis, foliis terminalibus ellipticis obtusis, floribus confertis lateralibus.
Jamaica. ♄.

retusa. 3. B. foliis oppositis cuneato-ovatis retusis rigidis, floribus confertis axillaribus. Achras 7. *Brown. jam.* 201.
Jamaica. &c. ♄.

montana. 4 B. foliis sparsis alternis oblongis apice obtusis, floribus axillaribus pedunculatis.
Jamaica. ♄.

ſalicifolia. 5. B. foliis lanceolato-ovatis acuminatis, floribus confertis axillaribus & lateralibus. Achras ſalicifolia *Linn.*

rotundifolia. 6. B. foliis ſuborbiculatis marginatis venoſis coriaceis utrinque glabris.
India occidentalis. ♄.

pentagona. 7. B. foliis lanceolatis acuminatis nitidis, floribus axillaribus, drupis pentagonis. *
India occidentalis, Inſ. S. Vincent. ♄.

RHAMNUS.

ellipticus. 12–13. R. inermis, floribus hermaphroditis ſub 3-gynis, fructibus trilocularibus, foliis ellipticis integris, umbellis axillaribus.
Rhamnus. *Brown. jam.* 172. 1. tab. 29. f. 2.
Jamaica. ♄.

ſphæroſpermus. 12–13. R. inermis, floribus hermaphroditis racemuloſis, baccis ſubrotundis 3-locularibus pellucidis, foliis oblongis ſerratis glabris.
Jamaica. ♄.

RUYSCHIA. Jacq.

Calyx 5-phyllus, bractea clauata ſubjecta.
Cor. reflexa. Stylus nullus.
Fructus polyſpermus.
(Inter *Celaſtrum* & *Evonymum.*)

Cluſiæfolia. 1. R. foliis obovatis integris avenüs; floribus bractea ſolitari. * Ruyſchia Cluſiæfolia.
Jacq. am. 75. t. 51. 2.
India occidentalis. ♄.

Souroubea. 2. R. foliis obovatis emarginatis, apice denticulatis venoſis; floribus bracteis tripartitis. *
Souroubea gvianenſis. *Aubl. gvian.* p. 244. fig.
Gviana. ♄.

ITEA.

Cyrilla. 2. I. foliis lanceolatis integris membranaceis.
Cyrilla racemiflora. *Linn.*
Jamaica. ♄.

HIR-

HIRTELLA.

triandra. 2. H. foliis oblongis acuminatis, racemis compositis laxis, floribus triandris.
Hirtella americana. *Jacq. amer.*
Jamaica, Domingo. ♄.

paniculata. 3. H. foliis ellipticis hirsutis nitidis subcoriaceis, racemis erectis, floribus 5-dris. *
Cayenna. ♄.

HEDERA.

pendula. 3. H. foliis ovato-lanceolatis integris, pedunculis longissimis pendulis.
Jamaica. ♄.

nutans. 4. H. foliis ellipticis coriaceis, umbellis nutantibus hæmisphæricis.
Jamaica. ♄.

ACHYRANTHES.

altissima. 7-8. A. caule suffruticoso scandente, paniculis terminalibus axillaribusque ramosis. *Jacq. amer.* 81. Celosioides *Locfl. it.* 301. Celosia. 2. *Brown. jam.* Blitum. *Sloan.* h. 1. p. 142. t. 91. f. 2. Amaranthus. *Plum. spec.* 6.
India occidentalis. ♄.

GARDENIA.

Genipa. 6-7. G. inermis, foliis oblongo-lanceolatis, pedunculis axillaribus multifloris, corollis hypocrateriformibus, tubo abbreviato. *
Genipa americana. *Linn. Fig. Plum.*

armata. 7-8. G. spinis ramulorum terminalibus quaternis, laciniis calycinis linearibus cuneiformibus, floribus confertis.
Musfenda spinosa *Linn. Jacqv.*

Randia. 7–8. P. (ſpinoſa) ſpinis ramorum decuſſatis, foliis ſubrotundis, corollis hypocrateriformibus, dentibus calycinis lanceolato-ſubulatis. Randia aculeata. *Linn. Brown. jam.* 143. t. 8. f. 1.

mitis. (b.) ſubinermis, foliis ſubovalibus. Randia mitis. *Linn.*

ECHITES.

domingenſis. 3–4. E. pedunculis racemoſis, foliis cordato-ovatis, rigidiuſculis, ſubtus diſcoloribus, caule volubili. E. domingenſis. *Jacqv. ic. rar. Coll.* 1. p. 73.
Indıa occidentalis. ♄.

aſperuginis. 4–5. E. pedunculis racemoſis, folliculis filiformibus; foliis oblongis acutis, ſuperne aſperis, caule volubili.
Apocynum *Plum. ic.* XXVII.
India occidentalis, Jamaica, Domingo. ♄. ?

circinalis 6–7. E. pedunculis axillaribus multifloris articulatis, laciniis corollæ undulatis; foliis ellipticis, caule volubili.
Hiſpaniola.

floribunda. 6–7. E. racemis corymboſis, foliis ovatis acuminatis, nervis paralellis, ramis erectiuſculis.
Jamaica. ♄.

TABERNÆMONTANA.

diſcolor. 5–6. T. foliis oppoſitis ouato-lanceolatis, pedunculis axillaribus bifloris.
Jamaica. ♄.

DIGYNIA.

CYNANCHUM.

criſpiflorum. 3–4. C. caule volubili, foliis ſubtus villoſis oblongis cordatis; ſinu clauſo, petalis apice criſpis. Periploca florum diviſuris circinatis et criſpis. *Plum. ic.* 216. f. 1.
India occidentalis, Jamaica.

parvi-

parviflorum. 12–13. C. caule volubili filiformi, foliis ovatis apice subulatis, umbellis subsessilibus. Periploca foliis ovatis, etc. *Plum. ic.* 215. f. 1. *India occidentalis.*

ASCLEPIAS.

viminalis. 4–5. A. caule suffruticoso volubili filiformi, foliis oppositis lanceolatis glabris, umbellis lateralibus multifloris. Asclepias. 3. *Brown. jam.* 183. Apocynum *Sloan. Hist.* t. 131. Cynanchum. *Plum. ic.* 27. f. 2. ?
Jamaicâ.

MICROTEA. (XII. a.)

Calyx 5-phyllus; patens. *Cor.* nulla.
Drupa sicca, echinata.
(ante *Salsolam.*)

debilis. 1. MICROTEA. *
St. Christopher. ☉.

CELTIS.

aculeata. 2–3. C. foliis cordato-ovatis, apice obtusis subintegris glaberrimis, ramis aculeatis.
Rhamnus Igvaneus. *Jacq. am.* 74. 1.
Hispaniola. ♄.

micranthus. 4. C. foliis oblique cordatis ovato-lanceolatis serrulatis superne scabriusculis.
Rhamnus micranthus. *Linn.* Zizyphus arborescens. *Brown.*

lima. 5. C. foliis ovato-lanceolatis acuminatis oblique cordatis serratis superne scaberrimis. Loti arboris folio auguſt. arbor baccifera. *Sloan.* h. 2. p. 80.
Muntingia folio ulmi aspero. *Plum. gen.* p. 47. ?
India occidentalis. ♄.

ROCHEFORTIA. (XLIII.)

Calyx 5-partitus.
Cor. infundibuliformis, fauce aperta.
Peric. 2-loculare, polyspermum.
(post *Schreberam.*)

cuneata. 1. R. foliis cuneiformibus obovatis integris.
ovata. 2. R. foliis ovatis emarginatis.
Jamaica. ♄. ♄.

DICHONDRA. Forst. (XLV.)

Calyx 5-partitus. *Cor.* rotata, 5-partita.
Capſulæ duæ.
(inter *Namam* & *Hydroleam.*)

ſericea. 1. D. foliis ſubtus ſericeis.
Jamaica. ☉.

HYDROLEA.

trigyna. 2. H. ſpinoſa, foliis oblongis hirſutis, floribus trigynis axillaribus. * Campanula americana ſpinoſa & hirſuta, flore patulo & ſeſſili cæruleo. *Houſt. mſc.*
India occidentalis.

HYDROCOTYLE.

hirſuta. 3–4. H. hirſuta, foliis reniformibus lobatis crenatis, floribus verticillatis verticillis quadrifloris.
Hiſpaniola.

PANAX.

attenuata. 1–2. P. foliis 3–natis 5–natiſue, foliolis ovatis attenuatis crenatis, caudice arboreſcente. *
India occidentalis. ♄.

TRIGYNIA.

VIBURNUM.

villoſum. 2–3. V. foliis integerrimis ovatis, ſubtus incano-villoſis.
Jamaica. ♄.

STA-

STAPHYLEA.

occidentalis. 1–2. S. foliis duplicato pinnatis, capsulis 3-gonis, seminibus solitariis, caule arboreo. *Sloan.* h. t. 220. f. 1. *Pluk. mant.* t. 269. f. 1. *Jamaica* ♄.

EVOLVOLUS.

sericeus. 4–5. E. foliis lanceolatis sessilibus subtus sericeis, pedunculis brevibus unifloris. Convolvolus erectus herbaceus subhirsutus, foliis linearibus, pedunculis brevibus. *Brown. jam.* 153. 3. t. 10. f. 3. *Jamaica.*

PENTAGYNIA.

ARALIA.

capitata. 1–2. A. arborea, foliis simplicibus ellipticis integerimis, paniculis terminalibus, floribus sessilibus capitatis. *Jacq. am.* 89. 2. t. 61. *India occidentalis.* ♄.

sciodaphyllum. 3–4. A. arborescens, petiolis pedatis, foliis umbellatis terminalibus petiolatis, foliolis aliis centralibus, spicis longissimis nutantibus. Sciodaphyllum. *Brown. jam.* 195. t. 19. f. 1. 2. *Jamaica,* ♄.

CLASSIS VI.

HEXANDRIA.

MONOGYNIA.

HEPETIS. (X)

Calyx 3-partitus. *Cor.* 3-petala.
Capſula ſemiſupera, 3-locularis.
Sem. mutica.
(inter *Tillandſiam* & *Burmanniam.*)

anguſtifolia. 1. HEPETIS.
Jamaica.

BROMELIA.

bracteata. 4-5. B. foliis ſerrato-ſpinoſis, bracteis ovato-lanceolatis, ſcapo elongato, racemo compoſito, racemulis ſubdiviſis floribus ſeſſilibus. Aloë americana arboribus adnaſcens. *C. mſc.* 35. *fig.*
Jamaica. ♃.

paniculigera. 4-5. B. foliis ſerrato-ſpinoſis, bracteis lanceolatis, racemo compoſito, racemulis ſubdiviſis, floribus pedunculatis.
India occidentalis. ♃.

TILLANDSIA.

faſciculata. 5-6. T. ſpicis imbricatis lateralibus diſtichis, foliis lanceolato-ſubulatis erectis ſtrictis. *fig. Plum.*
Jamaica. ♃.

nutans. 5-6. T. ſcapo ſubnudo, panicula nutante, foliis radicalibus ovato-lanceolatis membranaceis.
Jamaica. ♃.

flexuoſa. 5-6. T. ſcapo ſubdiviſo, ſpicis laxis flexuoſis, ſpiculis diſtichis remotiuſculis, foliis lineari-lanceolatis reclinatis. *Jacq. am.* 92. t. 63. (Tillandſia tenuifolia.)
Jamaica. ♃. cane-

canescens. 7–8. T. foliis linearibus erectis caulem æquantibus incanis; spicis subternis.
Jamaica. ♃.

angustifolia. 7–8. T. foliis lineari-lanceolatis rectis glabris, caulem superantibus, spicis sparsis fasciculatis.
Jamaica. ♃.

TRADESCANTIA.

monandra. 4–5. T. diffusa, foliis ovatis acuminatis, floribus monandris umbellulatis, involucello 4-phyllo.
Hispaniola. ☉.

multiflora. 4–5. T. erecta, ramosa, foliis cordatis margine vaginisque ciliatis, pedunculis congestis, floribus umbellatis 3-andris.
Jamaica.

cordifolia. 4–5. T. repens, lævis, foliis cordatis, pedunculis elongatis multifloris.
Jamaica. ☉.

Zanonia. 1–2. T. erecta, lævis, pedunculis solitariis geniculatis multifloris. Commelina Zanonia. *Linn.*

Spathacea. 7–8. T. acaulis, foliis sessilibus, scapis radicalibus.
India occidentalis, *Campechia.* ♃.

PONTEDERIA.

azurea. 2–3. P. foliis subrotundo-ellipticis, basi incrassatis, floribus spicatis. * Pontederia 1. *Brown. jam.* 195.
Jamaica.

limosa. 3–4. P. foliis cordato-ovatis, spathis lateralibus unifloris, floribus triandris. Nymphææ affinis planta palustris aqvatica, flore hexapetalo stellato cæruleo. *Sloan. jam.* h. I. t. 149. f. 1.
Jam. Hispaniola.

THRINAX.

PALMA. *Cal.* 6-dentatus. *Cor.* nulla. *Stigma* emarginatum. *Bacca* 1-sperma. (pone *Calamum.*)

parviflora. 1. THRINAX. Corypha 1. *Brown. jam.* 190.
Jamaica, *Hispaniola.* ♄.

COCOS.

aculeatissimo. 4. C. spinosa tota, caudice frondibus foliolisque: spinis setaceis.
Palma pinnis inferne vaginantibus, caudice tereti aculeatissimo. *Brown. jam.* 343. 4.
Palma spinosa minor caudice gracili. *Sloan.* h. II. 124.
India occidentalis, Jamaica. ♄.

PRINOS.

montana. 3. P. foliis ovatis margine serratis, floribus hexandris, pedunculis axillaribus.
Jamaica. ♄.

sideroxyloides. 4. P. foliis subrotundis integerrimis. *
Montserrat. ♄.

LORANTHUS.

emarginatus. 5–6. L. racemis axillaribus simplicibus, foliis cuneatis ovatis emarginatis.
Hispaniola. ♄.

parvifolius. 8–9. L. pedunculis axillaribus trifidis, pedicellis unifloris, foliis ovatis integris.
Jamaica. ♄.

pauciflorus. 8–9. L. pedunculis trichotomis foliis brevioribus, foliis obovatis.
Jamaica. ♄.

HILLIA. LINN. (XXX.)

Calyx dupplex: *inferus* 6-phyllus.
Corolla longissima, contorta.
Capsula 2-locularis, 2-valvis, coronata.
Semina papposa.

tetrandra. 2. H. corollis quadrifidis tetrandris, laciniis ovatis, foliis obovatis.
Jamaica. ♄.

longiflora. 1. H. *corollis 6-fidis, laciniis lanceolatis revolutis, foliis ovatis acutis.* Hillia Parasitica. *Linn. Jacq.*

GUE-

GUETTARDA.

rugosa. 2. G. foliis subcordatis ovatis acutis, subtus tomentosis superne scabris, floribus hexandris.*
India occidentalis. ♄.

elliptica. 3. G. foliis ellipticis pubescentibus, floribus tetrandris.
Jamaica. ♄.

membranacea 4. G. foliis ovatis acuminatis membranaceis, subhispido scabris, floribus tetrandris.
Dommingo. ♄.

TRIGYNIA.

SMILAX.

oblongata. 4–5. S. caule aculeato angulato, foliis oblongis acuminatis glabris trinerviis, nervis subtus aculeatis.
India occidentalis. ♄.

RAJANIA.

angustifolia. 2–3. R. foliis lineari-lanceolatis, basi rotundatis.
Hispaniola. ♄.

ovata. 2–3. R. foliis ovatis acuminatis trinerviis.
Hispaniola.

CLASSIS VII.

HEPTANDRIA.

MONOGYNIA.

PISONIA.

subcordata. 1–2. P. inermis, foliis cordato-subrotundis, fructibus siccis subclavatis 5–gonis, angulis apice muricatis. *
India occidentalis, Antigua. ♄.

nigricans. 1–2. P. inermis, foliis ovatis acuminatis, floribus cymosis erectis, fructibus baccatis.
Pisonia inermis. *Jacq.* 275. 2.
Jamaica. ♄.

coccinea. 1–2. P. inermis, foliis lanceolato-ovatis, pedunculis terminalibus laxis, floribus nutantibus, fructibus baccatis.
Hispaniola. ♄.

CLASSIS VIII.

OCTANDRIA.

MONOGYNIA.

RHEXIA.

leucantha. 6. R. foliis oppositis cartilagineo-denticulatis coriaceis nitidis; ramulis tetragonis, floribus terminalibus decandris.
Jamaica. ♄.

purpurea. 7. R. foliis oppositis denticulatis coriaceis, ramulis teretibus, floribus axillaribus decandris.
Jamaica. ♄.

HYPELATE. Brown.

POLYGAM. *Calyx* 5-phyllus. *Cor.* 5-petala.
Stigma deflexum, trigonum.
Drupa monosperma.
(pone *Melicoccam.*)

trifoliata. 1. HYPELATE. *Brown. jam.* 207. 1. Cytisus arboreus, foliis obtusis glabris, foliorum — *Sloan.* h. 2. 33.
Jamaica. ♄.

CUPANIA. Linn. (XXIII. c.)

Calyx 5-phyllus. *Cor.* 5-petala.
Petala apice cucullata.
Stylus trifidus.
Capsula 3-locularis. *Sem.* solitaria.
(ante *Alophyllum.*)

tomentosa. 2. C. foliis pinnatis obovatis retusis inferne ferrugineo-tomentosis, Trigonis tomentosa.
Jacq. am. 102. 1.
Hispaniola. ♄.

glabra. 3. C. foliis pinnatis ovatis obtusis crenatis glabris, Cupania. *Brown. jam.* 178.
Jamaica. ♄.

Sapo-

ſaponarioides. 4. C. foliis pinnatis oblongis integris, ſubtus ſcabris. *
India occidentalis. ♄.

ALOPHYLLUS.

rigidus. 2. A. foliis ſimplicibus denticulato ſpinoſis, floribus racemoſis.
Hiſpaniola. ♄.

raecmoſus. 3. A. foliis ternatis, floribus racemoſis.
Hiſpaniola. ♄.

Cominia. 4. A. foliis ternatis, floribus paniculatis.
Rhus comminia. *Linn.* Baccifera indica 3-folia, fructu rotundo 1 pyreno. — *Sloan.* h. 2. 100. t. 208. f. 1.
Jamaica. ♄.

HEDWIGIA.

Calyx 4-dentatus. *Cor.* 4-fida.
Stylus nullus.
Capſula tricocca. *Sem.* nux.
(Inter *Guaream* & *Amyridem.*)

balſamifera. 1. HEDWIGIA.
Bois cochon. *Nicolſ. Hiſt. St. Doming.* 169.
Hiſpaniola. ♄.

FUCHSIA.

involucrata. 3. F. floribus involucratis.
Jamaica. ♄.

VACCINIUM.

meridionale. 12–13. V. floribus racemoſis, foliis ovatis crenato-ſerratis ſempervirentibus, caule arboreo.
Jamaica. ♄.

DIOSPYROS.

tetraſperma. 6. D. foliis membranaceis nitidis cuneiformibus, baccis tetraſpermibus.
Jamaica. ♄.

DAPH-

DAPHNE.

Lagetto. 10–11. D. ſpicis paniculatis terminalibus, foliis ovatis acutis. *Brown. jam.* 371. t. 31. f. 5. Laurifolia arbor. *Sloan.* h. 2. 22. t. 168. 1. 2. 3. 169. 1. Bois dentelle. *Nicolſ. Doming.* 172. t. 1. f. 1, 2, 3, 4, 5. *Jamaica, Hiſpaniola.* ♄.

tinifolia. 11–12. D. racemis compoſitis erectis, floribus terminalibus confertis foliis oblongis. Laurus americana. *Mill.* *Jamaica.* ♄.

occidentalis. 11–12. D. pedunculis axillaribus, floribus terminalibus umbellulatis dicicis, foliis alternis lanceolatis glabris. *Jamaica.* ♄.

VALENTINIA.

Calyx 5-partitus, coloratus, patens.
Corolla nulla.
Capſula baccata, 1-locularis 4-ſperma.
(pone *Dodonæam.*)

Ilicifolia. 1. VALENTINIA.
Malpighia aqvifolii amplioribus foliis. *Plum. ic.* 167. f. 2.
Ilex, foliis aqvifolii americana. *Pluk. phyt.* 196. f. 3.
Hiſpaniola, Cuba. ♄.

DIGYNIA.

WEINMANNIA.

hirta. 1–2. W. foliis pinnatis; foliolis ovatis ſerrato-crenatis, ſubtus racemisque hirſutis.
Windmannia. *Brown. jam.* 212.
Jamaica. ♄.

TE-

TRIGYNIA.

COCCOLOBA.

nivea. 3–4 C. foliis ellipticis acuminatis venosis supra nitidis, racemis erectiusculis. C. nivea *Jacq. am.* 115. t. 78.
Jamaica, Hispaniola. ♄.

PAULINIA.

Vespertilio. 12–15. P. foliis pinnatis, foliolis ovatis acuminatis incisis, petiolis nudis, capsulis pedicellatis, alis horizontalibus lanceolatis. *
India occidentalis. ♄.

divaricata. 9–10. P. foliis 2-ternatis, foliolis ovatis acutis subintegris, petiolis nudis, paniculis divaricatis, alis capsularum ovatis.
Jamaica. ♄.

CARDIOSPERMUM.

grandiflorum. 3. C. foliis pubescentibus, capsulis acuminatis maximis lævibus.
Jamaica. ♄.

CLASSIS IX.

ENNEANDRIA.

MONOGYNIA.

LAURUS.

montana. 4–5. L. foliis 3–plinerviis ovato-acuminatis perennantibus, floribus racemoso-paniculatis. *Jamaica.* ♄.

exaltata. 11–12. L. foliis ovato-lanceolatis venosis coriaceis perennantibus planis; racemis erectis compositis, calyce cyathiformi persistente. *Jamaica.* ♄.

triandra. 11–12. L. foliis lato-lanceolatis perennantibus planis; floribus triandris, fructu calyce tecto. *Jamaica.* ♄.

coriacea. 11–12. L. foliis ovatis acuminatis planis venosis nitidis coriaceis, racemis erectis foliis brevioribus. *Jamaicâ.* ♄.

Leucoxylon. 11–12. L. foliis oblongo-lanceolatis planis perennantibus, racemis foliis brevioribus, calycibus incrassatis verrucosis. Laurus *Brown. jam.* 214. 2. *Jamaica.* &c. ♄.

membranacea. 11–12. L. foliis oblongis acuminatis venosis convexis coriaceo-membranaceis, ramis racemisque erectis, folio brevioribus. *Jamaicâ, Hispaniolâ.* ♄.

patens. 11–12. L. foliis ovato-lanceolatis planis membranaceis, racemis erectis diffusis foliis longioribus. *Jamaica.* ♄.

pendula. 11–12. L. foliis oblongis venosis membranaceis perennantibus, racemis laxis fructubus pendulis, calycibus deciduis. Laurus 3. *Brown. jam.* 214. ♄.

floribunda. 11–12. L. foliis ovato-lanceolatis planis membranaceis, floribus racemoso-paniculatis laxis terminalibus. *Jamaica.* ♄.

CLASSIS X.

DECANDRIA.

MONOGYNIA.

SOPHORA.

monoſperma, 3–4. S. foliis impari-pinnatis, pinnis 5-jugis; leguminibus monoſpermis, caule arboreo.* Glycine 3. *Brown. jam.* 298. *India occidentalis.* ♄.

BAUHINIA.

porrecta. 7–8. B. floribus ſub-10-dris; foliis cordatis, lobis porrectis acutis trinerviis, petalis lanceolatis. Bauhinia non aculeata folio ampliori & bicorni. *Plum. gen.* 23. *ic.* 32. t. 44. f. 2. Bauhinia. 1. *Brown. jam.* Sennæ ſpuriæ __ *Sloan.* j. 150. h. 2. 51. *Jamaica, Hiſpaniola.* ♄.

CASSIA.

ſericea. 10–11. C. foliis ſub 4-jugis ovatis hirſutis, glandula ſubulata inter foliolos, pedunculis 4-floris, leguminibus 4-gonis. C. ſericea. *Mill. dict.* *Jamaica.*

lineata. 14–15. C. foliis 5-jugis oblongiuſculis ſubtus pubeſcentibus æqvalibus, glandula obſoleta ſub infimis; pedunculis unifloris. *Jamaica.* ♄.

virgata. 28–29. C. foliis decemjugis ovato-lanceolatis villoſis, glandula petiolari pedicellata; pedunculis unifloris fol. longioribus. *Jamaica.*

TRI-

TRICHILIA.

ſpondioides. 1–2. T. foliis impari-pinnatis ſubhirſutis, pinnis ſub-10-jugis, inferioribus majoribus, racemis axillaribus. T. ſpondioides. *Jacq. am.* 128. *Sloan* h. 2. 103. t. 210. 2. 3. *Jamaica, Hiſpaniola.* ♄.

pallida. 2–3. T. foliis impari pinnatis membranaceis, racemis axillaribus terminalibuſque, floribus octandris, filamentis villoſis, capſulis 2–valvibus. *Hiſpaniola.* ♄.

moſchata. 2–3. T. foliis pinnatis, pinnis alternis, racemis compoſitis, floribus ſub 10–dris 1–petalis, fructubus 1–ſpermis. Laurus folio breviore, flore racemoſo minore — *Sloan.* h. 2. p. 21. t. 166. f. 2. *Jamaica,* ♄.

MELIA.

ſempervirens. 1–2. M. foliis bipinnatis, foliolis rugoſiuſculis ſubſeptenis. M. Azedarach. b. *Linn.*

OCHNA. Linn. (lii.)

Cal. 5-phyllus. *Cor.* 5-petala.
Antheræ ſubſeſſiles.
Drupæ receptaculo incraſſato ſubrotundo carnoſo inſertæ.
(inter *Quaſſiam* & *Fagoniam.*)

nitida. 2. O. calycibus corollæ æqvalibus, drupis receptaculo ſuperimpoſitis, foliis ellipticis ſerratis. *India occidentalis.* ♄.

Iaborapita. 1. O. *petalis calyce 3-plo majoribus, drupis receptaculo immerſis.* O. Iaborapita. *Linn.*

QUASSIA.

excelſa. 2–3. Q. floribus hermaphroditis 5–dris paniculatis; foliis impari-pinnatis, foliolis oppoſitis, petiolatis, petiolo nudo. *Jamaica.* ♄.

TERMINALIA.

latifolia. 1–2. T. foliis obovatis ſubſerratis, drupis carnoſis. Arbor maxima, forte prunifera - *Sloan. hiſt.* 130.
Jamaica. ♄.

arbuſcula. 1–2. T. foliis ovato-lanceolatis integris pubeſcentibus, ramis dichotomis, racemis erectis.
Jamaica. ♄.

SAMYDA.

tomentoſa. 4–5. S. floribus octandris, (*Caſearia*) foliis ovatis ſerratis ſubtus tomentoſis.
Jamaica. ♄.

villoſa. 2–3. S. floribus decandris, (*Samyda*) foliis oblongis ſubſerratis baſi obliqvis ſericeis ſubtus villoſis; pedunculis ſolitariis axillaribus.
Jamaica. ♄.

glabrata. 2–3. S. floribus decandris, foliis ovato-lanceolatis integris nitidis, pedunculis axillaribus unifloris.
Jamaica. ♄.

ſpineſcens. 3–4. S. floribus decandris terminalibus, foliis lanceolato-ovatis obtuſis crenatis glabris, ramis patulis ſpineſcentibus.
Hiſpaniola. ♄.

MELASTOMA.

* *Decandræ, foliis trinerviis.*

procera. M. arborea, foliis trinerviis ſubdenticulatis glabris; racemo terminali, ſpicis ſimplicibus erectis, calycibus truncatis.
Melaſtoma foliis oblongis etc. *Plum. ic.* 142. f. 1.
Jamaica. ♄.

patens. M. fol. 3-nerv. ſubdenticulatis cordatis hirſutis; racemo terminali patulo, floribus diſtinctis dodecandris. M. umbellata. *Mill. dict.*
Jamaica. ♄.

rigida.

rigida. M. fol. 3-nerv. ſubdenticulatis ovatis ſubcordatis rigidis poſtice ſcabris; paniculis terminalibus ferrugineo-hirſutis.
Jamaica. ♄.

qvadrangularis. M. fol. 3-nerv. integris, ovato-lanceolatis glabris nervis coloratis, ramis qvadrangularibus; racemo ſtricto terminali.
Jamaica. ♄.

ſcandens. M. fol. 3-nerv. denticulatis ovatis acutis glabris, racemo terminali, ſpicis ſubſecundis; caule ſcandente.
Jamaica. ♄.

montana. M. fol. 3-nerv. denticulatis oblongis acutis glabriuſculis, racemo terminali ſpicis patulis, petalis retuſis, calyce truncato.
Jamaica. ♄.

ornata. M. fol. 3-nerv. integris rigidis ſupra hiſpidis, ſetis adpreſſis, ſubtus incanis; umbellis 4-fidis terminalibus paucifloris, capſulis hiſpidis. ✲
Jamaica. ♄

trinervia. M. fol. 3-nerv. absque marginali, oblongis baſi apiceque attenuatis integris, utrinque glabris tenuioribus; racemis ſimpliciuſculis terminalibus.
Jamaica. ♄.

ramiflora. M. fol. 3-nerv. integris ovato lanceolatis ſcabriuſculis; ramis floriferis, floribus pedunculatis ſubconfertis.
Jamaica. ♄.

✲✲.) *Decandræ, triplinerviæ.*

praſina. M. fol. 3-plinerviis integerrimis lato-lanceolatis glabris, panicula terminali patentiſſima. M. lævigata. *Aubl. guian.* c. *fig.*
Jamaica, Hiſpaniola etc. ♄.

* * *) *Decandræ, 5 nerviæ.*

argentea. M. foliis 5-nerviis ſub denticulatis ovatis glabris, inferne tomentoſis candidis; paniculis terminalibus patentibus.
Groſſularia fructu arbor maxima etc. *Sloan.* H. 2. 84. t. 199. f. 1.
India occidentalis. ♄.

elata. M. fol. 5-nerv. ſerrato-denticulatis oblongis coriaceis, ſubtus ferrugineo-tomentoſis; paniculis terminalibus patentibus, floribus ſeſſilibus.
Jamaica. ♄.

Tamonea. M. fol. 5-nerv. oblongo-lanceolatis acutis integris, ſubtus tomentoſo-incanis; racemis compoſitis terminalibus, racemulis brachiatis, bracteis geminis floribus ſubjectis.
Tamonea gvianenſis. *Aubl. gvian.* 441. t. 175. Groſſulariæ fructu arbor maxima — *Sloan.* H. 2. p. 84. *Pluk. phyt.* t. 264. f. 4.
India occidentalis. ♄.

albicans. M. fol. 5-nerv. integris ovatis acutis ſupra glabris, inferne tomentoſis albido-ferrugineis; racemis terminalibus erectis, floribus confertis ſeſſilibus.
Jamaica. ♄.

impetiolaris. M. fol. 5-nerv. denticulatis ſubſeſſilibus oblongis acuminatis coriaceis ſubtus tomentoſo-ferrugineis; paniculis terminalibus axillaribusque erectis.
India occidentalis. ♄.

ſplendens. M. fol. 5-nerv. integris oblongis acuminatis utrinque glabris, ſuperne nitidis; paniculis terminalibus erectis.
Melaſtoma foliis ovatis, etc. *Plum. ic.* 140.
Hiſpaniola. ♄.

coriacea. M. fol. 5-nerv. cartilagineo-denticulatis ovatis rugoſis glabris coriaceis, ramis petiolisque ſtrigoſis, ramis paniculæ tetragonis. *
Monſerrat. ♄.

ſtrigi-

ſtrigill. ſa. M. fol. 5-nerv. ſubdenticulatis ſubcordatis acuminatis, ſuperne ſtrigoſo-piloſis ſubtus tomentoſis; racemis axillaribus ſolitariis floribus pedicellatis confertis.
India occidentalis. ♄.

**** *Octandræ, foliis trinerviis.*

faſcicularis. M. foliis 3-nerviis integris ovatis acutis ſcabris, ramis floriferis, floribus breviter pedunculatis confertis.
Jamaica. ♄.

anguſtifolia. M. foliis 3-nerviis lineari-lanceolatis integris ſubtus incanis, ramis virgatis; paniculis terminalibus, floribus erectis.
India occidentalis. ♄.

micranthus. M. fol. 3-nerviis denticulatis oblongis acutis glabris; racemis axillaribus reclinatis, floribus acuminatis.
Jamaica. ♄.

capillaris. M. fol. 3-nerviis ſubdenticulatis lato-lanceolatis attenuatis glabris; pedunculis capillaribus trifloris axillaribus.
Jamaica. ♄.

rubens. M. fol. 3-nerviis denticulatis ovato-lanceolatis acuminatis glaberrimis, ramis petiolisque coloratis; racemo terminali, floribus confertis dioicis. Melaſtoma. 8. *Brown. jam.* 219.
Jamaica. ♄.

purpuraſcens. M. fol. 3-nerviis integris oblongis acutis ſtriatis glaberrimis; racemis lateralibus patulis, floribus diſtinctis.
Jamaica. ♄.

glabrata. M. fol. 3-nerviis ſubdenticulatis ovatis acutis glabris coriaceis; pedunculis terminalibus ſolitariis unifloris.
Jamaica. ♄.

alpina. M. fol. 3-nerviis integris ovatis coriaceis glabris; pedunculis ſimpliciter trichotomis; floribus diſtinctis.
India occidentalis. ♄.

hirſuta, M. foliis 3-nerviis ſubdenticulatis lato-lanceolatis attenuatis hirſutis; pedunculis axillaribus trifloris divaricatis.
Jamaica. ♄.

hirtella, M. fol. 3-nerviis, margine hiſpido-piloſis, pedunculis breviſſimis axillaribus trifloris.
Jamaica. ♄.

microphylla, M. fol. 3-nerviis ſubdenticulatis ovatis obtuſis ſuperne hiſpidis infra tomentoſis; pedunculis trifidis axillaribus. *
India occidentalis. ♃.

tetrandra, M. fol. 3-nerviis integris oblongis acuminatis baſi emarginatis glabris convexiuſculis; racemo erecto terminali, floribus tetrandris.
Jamaica. ♄.

***** *Octandræ, triplinerviæ.*

virgata, M. fol. 3-plinerviis integris ovato-lanceolatis acuminatis glaberrimis; ramis floriferis, racemis decuſſatis diffuſis ſparſis.
Jamaica. ♄.

Æleagnoides, M. fol. 3-plinerviis integris lato-lanceolatis ſubtus albido-tomentoſis; pedunculis terminalibus trichotomis, floribus ſolitariis. *
India occidentalis. ♄.

****** *Octandræ, 5-nerviæ.*

umbroſa, M. foliis 5-nerviis denticulatis lato-ovatis acuminatis utrinque hirtis; ramulis floriferis, racemis dichotomis patentibus; ramis petiolisque hirſutis.
St. Chriſtoffer. ♄

piloſa, M. fol. 5-nerviis denticulatis oblongis acutis ſubtus hirſutis; racemis lateralibus hirſutis.
Jamaica ♄.

hiſpida, M. fol. 5-nerviis ſubdenticulatis ovatis acutis, ſuperne ſcrigoſo-hirſutis ſubtus reticulato-tomentoſis, paniculis terminalibus divaricatis.
India occidentalis. ♄.

aqua-

aquatica. M. foliis 5-nerviis cordatis acutis crenulatis, ſuperne hirtis, ſubtus lævibus; paniculis terminalibus trichotomis diffuſis. *
M. aqvatica. *Aubl. gvian.* p. 430. t. 169.
India occidentalis. ♄.

PETALOMA.

Calyx cyathiformis 5-dentatus.
Petala 5 calyci inter dentes inſerta.
Bacca 1-locularis 1-4-ſperma.
(inter *Murrayam* & *Melaſtomam.*)

myrtilloides. 1. P. pedunculis ſolitariis unifloris, foliis ſubſeſſilibus ovatis attenuatis baſi obliquis.
Myrti folio etc. *Sloan. Hiſt.* 2. p. 78. t. 187. f. 3.
India occidentalis. ☿.

Mouriri. 2. P. pedunculis corymboſis axillaribus, foliis petiolatis ovatis acuminatis, baccis 4-ſpermis. *
Mouriri gvianenſis. *Aubl. gvian.* 452. t. 180.
Gviana. ♄.

ANDROMEDA.

faſciculata. 5-6. A. pedunculis aggregatis, corollis .... foliis alternis ovato-lanceolatis obtuſis ſubcrenulatis coriaceis.
Jamaica. ♄.

Iamaicenſis. 5-6. A. pedunculis aggregatis, corollis ovatis diaphanis; foliis alternis lato-lanceolatis obtuſis integris, ſubtus cinereis membranaceis.
Jamaica. ♄.

octandra. 5-6. A. pedunculis aggregatis, corollis cylindricis 4-fidis; foliis alternis ovato-lanceolatis integris membranaceis.
Jamaica. ♄.

EPIGÆA.

cordifolia. 2. E. foliis cordatis ſubrotundis ſerratis convexis hiſpidis rigidis, corollis ovatis. *
Guadeloupe. ♄.

repens. 1. E. *foliis cordato-ovatis integris planis aſperis; corollis cylindricis.* E. repens. *Linn.*

CLETHRA.

trifolia. 2. C. arborea, foliis oblongo-lanceolatis integerrimis ſubtus incanis; racemis paniculatis ſpicæformibus tomentoſis.
Tinus occidentalis. *Linn.* Volkameria. *Brown. jam.* 214. t. 21. f. 1. *Sloan. Hiſt.* 2. 36. t. 198. f. 2.
Jamaica. ♄.

Alnifolia. 1. C. *fruticoſa, foliis obovato-lanceolatis ſerratis glabris, racemis ſimplicibus ſpicæformibus.* C. alnifolia. *Linn.*

STYRAX.

glabrum. 2. S. foliis oblongis ſubſerratis utrinque glabris; pedunculis axillaribus ſimplicibus confertis multifloris, floribus nutantibus.
India occidentalis, Vincenti. ♄.

officinalis. 1. S. *foliis ellipticis integris ſubtus tomentoſis.* S. officinalis. *Linn.*

TRIGYNIA.

MALPIGHIA.

faginea. 3–4. M. foliis oblongo-ovatis integris ſubtus ſericeo-nitidis; pedunculis 3-partito-umbellatis. *
India occidentalis., ♄.

lucida. 3–4. M. foliis obovatis cuneiformibus integerrimis enerviis nitidis, pedunculis terminalibus multifloris. *
India occidentalis. ♄.

coriacea. 6–7. M. foliis ovatis acutis integris utrinque glabris; racemis terminalibus ſpicatis.
Malpighia. 6. *Brown. jam.* Tiliæ affinis laurifolia — *Sloan. jam.* h. 2. 163. f. 1.
Jamaica. ♄.

BANI-

BANISTERIA.

longifolia. 3-4. B. foliis oblongis acuminatis rigidis nitidis, panicula terminali, ramis patentissimis.
India occidentalis. ♄.

TRIOPTERIS.

Citrifolia. 2. T. foliis oblongis integris utrinque glabris; racemis axillaribus ramis dichotomis, capsulis 4-alaribus.
Acer scandens tricoccos fol. citri. *Plum. ic.* t. 16.
Jamaica. ♄.

rigida. 3. T. foliis subrotundis acutis marginatis lineatis coriaceis; racemis compositis axillaribus, capsulis trialatis.
Hispaniola. ♄.

ERYTHROXYLON.

squamatum. 3. E. foliis ovatis acuminatis, ramulis squamosis, drupis acutis. *
India occidentalis. ♄.

CLASSIS XI.

DODECANDRIA.

MONOGYNIA.

TRIUMFETTA.

rhombeæfolia. 3–4. T. foliis rhomboideis, ſummis lanceolato-ovatis; floribus completis.
T. rhomboidea. *Jacq. am.* 147. t. 90.
Indıa occidentalis. ♄.

LYTHRUM.

cordifolium. 8–9. L. foliis oppoſitis ſubſeſſilibus cordatis acutis ſcabris, racemis terminalibus axillaribusque, floribus decandris.
Hiſpaniola. ♄.

ciliatum. 8–9. L. foliis oppoſitis petiolatis ovatis glabris, margine ciliatis; racemis terminalibus, floribus ſubſecundis decandris.
Jamaica. ♄.

TRIGYNIA.

EUPHORBIA.

glabrata. 13–14. E. inermis, frutescens ramoſa, foliis oppoſitis ovatis acutis glabris integerrimis.
Peplis fruticoſa marittima geniculata. *Sloan.* h. 2. 198.
Jamaica. ♄.

obliterata. 33–34. E. umbella trifida; foliis oblongis trapezoideis ſerratis pubeſcentibus, altera baſeos parte obliteratis. E. obliterata. *Jacq. am.* 151. 5.
Jamaica. ♄.

punicea. 51–32. E. umbella 5–fida, trifida, involucellis ovalibus acuminatis coloratis, capſulis glabris; foliis lanceolato-cuneiformibus ſubtus glaucis.
Jamaica ♄.

CLAS-

CLASSIS XII.

ICOSANDRIA.

MONOGYNIA.

CACTUS.

pendulus. 14–15. C. pendulus, ramis verticillatis teretibus glabris muticis. Cassytha polysperma *Mill. ic.* Cactus. *Brown. jam.* 238. Viscum.—*Sloan.* h. 2. p. 93.
Jamaica, Hispaniola. ♄.

alatus. 22–23. C. prolifer, ensiformis compressus crenatus. Cactus 5. *Brown. jam.* 237. Opuntia non spinosa. *Sloan.* h. 3. 159. 2.
Jamaica. ♄.

PSIDIUM.

montanum. 1–2. P. foliis oblongis acuminatis crenulatis nitidis, pedunculis multifloris.
Psidium 2. *Brown. jam.* 238.
India occidentalis. ♄.

Gvincense. 1–2. P. foliis ovatis integris subtus tomentosis, pedunculis 3-floris.
Insula principis Africes, in Domingo culta. ♄.

MYRTUS.

alpina. 1–2. M. pedunculis solitariis terminalibus unifloris brevissimis; foliis ovatis, ramulis quaternis fastigiatis, caule arboreo.
Jamaica. ♄.

procera. 1–2. M. pedunculis confertis axillaribus unifloris; foliis ovatis acuminatis planis glabris, ramis virgatis, caule arboreo.
Hispaniola. ♄.

buxi-

ligustrina. 1–2. M. pedunculis solitariis ramosisque terminalibus unifloris; foliis lanceolatis obtusis convexis lucidis.
Hispaniola. ♄.

crenulata. 1–2. M. pedunculis solitariis axillaribus sub 3–floris; foliis subrotundis crenulatis glabris.
Hispaniola. ♄.

lineata. 7–8. M. floribus axillaribus subsessilibus, foliis ovatis acuminatis rigidis lineatis subtus incanis.
Hispaniola. ♄.

cordata. 7–8. M. floribus axillaribus lateralibusque subsessilibus, foliis sessilibus cordatis ovatis nitidis.
India occidentalis ♄.

buxifolia. 7–8. M. racemulis brevissimis confertis axillaribus; foliis cuneatis oblongis obtusis convexiusculis.
India occidentalis. ♄.

glabrata. 7–8. M. racemulis brevissimis axillaribus multifloris; foliis ellipticis acuminatis convexis coriaceis glaberrimis.
Hispaniola. ♄.

distichâ. 7–8. M. pedunculis axillaribus multifloris foliis brevioribus; foliis distichis deflexis ovato-lanceolatis, ramis patentibus.
Jamaica. ♄.

monticolâ. 7–8. M. pedunculis multifloris brevissimis axillaribus solitariis; foliis ovatis obtusatis planis glaberrimis.
Jamaica. ♄.

axillâris. 7–8. M. pedunculis multifloris brevissimis axillaribus confertis; foliis ovatis acuminatis nitidis planis.
Jamaica. ♄.

Gregii. 7–8. M. pedunculis multifloris axillaribus; foliis ovatis ellipticis acutis integerrimis subtus pubescentibus. *
India occidentalis, Antigua. ♄.

virgul-

virgultoſa. 8–11. M. pedunculis axillaribus terminalibusque paniculatis, pedicellis remotis decuſſatis unifloris; foliis lato-lanceolatis attenuatis, ramis virgatis, caule arboreo.
Myrtus fol. ovato-lanceolatis. *Plum. ic.* 208. f. 1.
Jamaica. ♄.

ſplendens. 8–11. M. pedunculis axillaribus ſolitariis trichotomis; foliis ellipticis acuminatis planis venoſis ſcarioſis nitidis, ramis virgatis.
Hiſpaniola. ♄.

acris. 13–14. M. pedunc. axillaribus terminalibusque corymboſis trichotomis foliis longioribus; foliis ellipticis convexis coriaceis venoſis punctatis, caule arboreo. * M. caryophyllata. *Jacq. obſ.* 2. 1. Caryophyllus. 1. *Brown. jam.* 247. *Pluk. alm.* 188. t. 155. f. 3.

b. *pedunculis trichotomis terminalibus; foliis ſubrotundo-ellipticis convexis coriaceis avenis punctatis utrinque nitidis.* Myrtus cotini folio. *Plum. ic.* t. 208. f. 2.
India occidentalis. ♄.

fragrans. 13–14. M. pedunculis axillaribus trichotomis ſimplicibusque; foliis ovatis convexiuſculis ſubcoriaceis punctatis glabris, caule arboreo.
Eugenia montana. *Aubl. gvian.* 495. t. 195.
Jamaica. ♄.

CALYPTRANTHES. (XIX. a.)

Calyx truncatus, ſuperus, operculo calyptriformi, deciduo. *Cor.* nulla.
Bacca monolocularis 1-4-ſperma.
(pone *Myrtum.*)

Chytraculia. 1. C. arborea, pedunculis terminalibus paniculatis trichotomis tomentoſis; foliis ovatis apice attenuatis. Myrtus Chytraculia. *Linn.*

Zuzygium. 2. C. arboreſcens, pedunculis axillaribus trichotomis patulis; foliis ovatis obtuſis, ramis dichotomis. Myrtus zuzygium. *Linn.*

rigi-

rigida. 3. C. arborescens, pedunculis solitariis axillaribus subtrifloris; foliis ovatis acutis convexis aveniis rigidis.
Jamaica. ♄.

PRUNUS.

occidentalis. 3–4. P. floribus racemosis, racemis lateralibus; foliis perennantibus eglandulosis oblongis acuminatis integris, utrinque glabris.
India occidentalis. ♄.

sphærocarpa. 3–4. P. floribus racemosis, racemis axillaribus; foliis semperirentibus eglandulosis integris nitidis, drupis subrotundis.
Myrti folio arbor — *Sloan.* h. 2. p. 79. t. 193. f. 1.
Hispaniola. ♄.

CLAS.

CLASSIS XIII.

POLYANDRIA.

MONOGYNIA.

TERNSTRŌMIA. L. (XXXVII. b.)

Cal. 5-partitus. *Cor.* monopetala urceolata, 5 partita.

Bacca ficca, polyſperma.

elliptica. 2. T. foliis ellipticis acutis integris, pedunculis lateralibus. ✲
India occidentalis, Guadeloupe, Vincentii. ♄.

meridionalis. 1. T. *fol. obovatis integris, pedunculis terminalibus. T.* meridionalis *Linn. ſuppl.*
India occidentalis. ♄.

punctata. 3. T. foliis oblongis integris ſubemarginatis margine punctatis, ped. axillaribus. ✲
Taonabo punctata. Aubl. gvian. 571. t. 228.

dentata. 4. T. foliis oblongis acuminatis dentato-ſerratis, ped. axillaribus lateralibusque. ✲
Taonabo dentata. Aubl. gvian. 569. t. 227.
Gviana. ♄. ♄.

CAPPARIS.

toruloſa. 7–8. C. pedunculis ſubbifloris teretibus terminalibus, foliis lanceolato-ovalibus, ſubtus albido-punctatis; ſiliquis teretibus linearibus toruloſis. *Breynia 2. Brown. j.* 246.
Jamaica. ♄.

longifolia. 7–8. C. pedunculis —, foliis lineari-lanceolatis, ſubtus farinoſo punctatis. *Pluk. am.* t. 327. f. 6.
Jamaica. ♄.

POSSIRA. Aublet. (XXV.)

Cal. 4-partitus.
Petalum unicum, laterale.
Legumen 1-loculare, 2-valve.

simplex. 1. P. foliis simplicibus oblongis.
Insulæ caribeæ. ♄.

triphylla. 2. P. foliis ternatis, petiolis marginatis. *
Posfira arborescens *Aubl. gvian.* 934. t. 353.
Gviana, Cayenna. ♄.

SLOANEA. Linn.

Cor. nulla. *Cal.* 1-phyllus.
Antheræ filamentis infra apicem adnatæ.
Capsula echinata 3-6 loc. 3-6 valvis.
Sem. bina, arillo baccato.
(ante *Trewiam.*)

Masfoni. 2. S. foliis cordato-ellipticis, stipulis linearibus; calyce 5-partito, setis capsulæ longissimis.*
Insulæ caribeæ, Christoph. etc. ♄.

dentata. 1. S. *foliis ovatis acutis, stipulis cordato 3-angularibus serratis.* S. dentata. *Linn. Plum.*

sinemarienfis. 3. S. foliis subrotundo-ovatis integris, capsulis ovatis setosis ex apice dehiscentibus. *.
S. sinemarienfis *Aubl. gvian.* 354. t. 212.
Insul. caribeæ, Christoph. Gviana. ♄.

APEIBA. Marcg. Aubl. (xxxvii.)

Calyx 5-phyllus. *Cor.* 5-petala.
Capsula multilocularis, echinata.
Loc. polysperma.
(inter *Bixam & Sloaneam.*)

Tibourbou. 1. A. foliis acute-serratis hirsutis.
Apeiba Tibourbou. *Aubl. gvian.* 538. t. 213.
Sloanea *Loefl. it.* 311. Apeiba. *Marcgr. braf.* 123. f. 124.
India occidentalis, Tobago, Gviana. ♄.

Petoumo. 2. A. foliis ellipticis acutis serrulatis subtus incanis. * *Aubl. gvian.* 543. t. 215.

aspera. 3. A. foliis integerrimis subtus pubescentibus, fructu compresso. * *Aubl. gvian.* 545. t. 216.

laris.

laevis. 4. A. foliis integerrimis, utrinque glabris, fructu aſpero depreſſo. * *Aubl. gvian.* 541. t. 214.
Gviana. ♄. ♄. ♄. †).

LIGHTFOOTIA.

♀. *Calyx* 4-phyllus. *Cor.* nulla.
Stigma ſeſſile. *Bacca* umbilicata, 1-locularis, 3-6-ſperma.

♂. ♀. } Hermaphrodit.

(inter *Prockiam & Corchorum.*)

ſerrata. 1. LIGHTFOOTIA.
Montſerrat. ♄.

LAETIA.

Guidonia. 12. L. floribus apetalis, pedunculis unifloris terminalibus, foliis oblongis acuminatis ſerratis pubeſcentibus.
Guidonia. *Brown. jam.* 249. t. 29. f. 4.?
Jamaica. ♄.

Thamnia. 1–2. L. floribus apetalis, pedunculis multifloris ſubdiviſis axillaribus, foliis oblongis acutis ſubcrenatis nitidis. Thamnia. *Brown. jam.* 245.
Jamaica. etc. ♄.

ACIDOTON. (XXXVIII.)

DIOIC. MONOIC. } ♂. *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* nulla.
Stam. receptaculo globoſo affixa.
♀. *Cal.* 6-phyllus. *Cor.* nulla.
Stylus 3-fidus. *Capſula* tricocca.

†). A. *petoumo, aſperam & laevem* ex Aubletio mutuavi, characteribus ſpecificis impoſitis ſecundum ſpecimina Aubletii in Muſeo Bankſiano aſervata.

urens. 1. ACIDOTON.
Urtica urens arborea, foliis oblongis angustis. *Sloan. j.* 38. h. 1. p. 125. t. 83. f. 1. *Jamaica.* ♄.

HEDYOSMUM.

MONOIC. ♂. *Amentum* antheris tectum.
Per. Cor. Fil. nulla.
♀. *Cal.* 3-dentatus. *Cor.* nulla.
Stylus unicus, triqueter.
Bacca trigona, monosperma.

nutans. 1. H. caule fruticoso, ramis laxis, foliis lanceolatis acuminatis.
Jamaica. ♄.

arborescens. 2. H. caule arborescente, ramis strictis erectis, foliis ovato-lanceolatis.
Jamaica. ♄.

MARILA. (XXXVII.)

Cal. 5 phyllus. *Cor.* 5-petala.
Capsula 4-locularis, polysperma.
Stigma simplex.
(inter *Laetiam* & *Elæocarpum.*)

racemosa. 1. MARILA. *
India occidentalis, Montserrat, Christoph. ♄.

LEGNOTIS. (XIX. b.)

Cal. 5-fidus. *Petala* 5 receptaculo inserta, lacera.
Capsula trilocularis.
(pone *Elæocarpum.*)

elliptica. 1. L. foliis ellipticis, floribus pedicellatis.
Jamaica. ♄.

Casipourea. 2. L. foliis ovatis, floribus sessilibus. *
Casipourea gvianensis. *Aubl. gv.* 529. t. 211.
Guiana. ♄.

ERO-

EROTEUM. (XXXVII. b.)

Calyx 5-phyllus. *Cor.* 5 petala. *Stylus* 3-fidus. *Bacca* exſucca, 3-locularis, polyſperma.

(pone *Theam.*)

Theæoides. 1. E. foliis ovato-lanceolatis ſerrato-dentatis, floribus axillaribus ſolitariis.
Jamaica. ♄.

undulatum. 2. E. foliis elliptico-lanceolatis acuminatis ſerratis, floribus confertis axillaribus. *
India occidentalis; *Chriſtopher*, *Montſerrat*, *Guadeloupe etc.* ♄.

MIMOSA.

alba. 1–2. M. inermis, foliis pinnatis 3–jugis, pinnis æqualibus ovatis acuminatis, petiolo ſubmarginato. *
Cayenna. ♄.

Laurina. 2–3. M. inermis, foliis pinnatis 2-jugis, pinnis ovatis nitidis ſubæqvalibus, petiolo lineari angulato, ſpicis axillaribus ſolitariis.
India occidentalis, *Chriſtopher.* ♄.

comoſa. 24–25. M. inermis, arborea, foliis 2-pinnatis 3-jugis, pinnis (9–10-jugis) ovalibus baſi retuſis, floribus paniculatis monadelphis.
Jamaica. ♄.

villoſa. 28–29. M. inermis, foliis 2-pinnatis ſub 5-jugis; pinnis ovatis petiolisque villoſis, floribus globoſis polyandris, caule fruticoſo.
India occidentalis. ♄.

mangenſis 30–31. M. ſpinis ſolitariis brevibus, foliis 2-pinnatis ſub 9-jugis, ſpicis globoſis axillaribus ſolitariis. M. mangenſis. *Jacq. am.* 267. 5.
India occidentalis, *Jamaicæ* ♄.

juliflora. 31–32. M. ſpinis ſtipularibus geminis, foliis 2-pinnatis 2-jugis glandula interſtinctis; ſpicis pendulis, leguminibus compreſſis.
Mimoſa. 2. *Brown. jam.* 251.
Jamaica. ♄.

TRIGYNIA.

HOMALIUM. Jacq. (XLII.)

Calyx 6-7-partitus. *Cor.* 6-7-petala.
Stam. 21 per tria aggregata.
Per. uniloculare, polyſpermum.
(ante *Delphinium.*)

racemoſum. 1. H. foliis ſerratis, racemis axillaribus terminalibusque, floribus pedunculatis. Homalium racemoſum. *Jacq. am.* 170. t. 183. f. 72.
Jamaica. ♄.

Racoubea. 2. H. foliis dentatis coriaceis, racemis terminalibus, floribus ſubſeſſilibus.
Racoubea gvianenſis. *Aubl. gvian.* p. 590. t. 236.
Gviana. ♄.

BEGONIA.

ſcandens. 2. B. ſcandens, radicans; foliis cordato-ovatis rectis obtuſe ſerratis, floribus paniculatis.
Begonia glabra *Aubl. gvian.* 916. t. 349. 13.
B. nivea maxima — *Plum. ſp.* 21 *ic.* 45.
India occidentalis, Jamaica. ♃.

purpurea. 3. B. cauleſcens, erecta; foliis cordatis ovato-lanceolatis, obſolete ſerratis obliquis; floribus paniculatis.
B. obliqva. b. *Spec. plant. Plum. ic.* 45. f. 3.
Rumex ſylveſtris ſcandens — *Brown. jam.* 203.
India occidentalis. ♄.

POLY-

POLYGYNIA.

MAGNOLIA.

Plumieri. 1–2. M. foliis perennantibus ovato-subrotundis utrinque glabris.* Magnolia. *Plum. gen. p.* 38. 7. *ic. not. Burm.* p. 161.
Lucia, Martinica, Guadeloupe. ♄.

UVARIA.

lanceolata. 1–2. U. foliis lanceolatis integris floribus axillaribus solitariis, ramis virgatis. Arbor foliis ovatis. etc. *Brown. jam.* 370. 11.
Jamaica. ♄.

CLASSIS XIV.

DIDYNAMIA.

GYMNOSPERMIA.

TEUCRIUM.

inflatum. 15-16. T. foliis oblongis acuminatis inæqvaliter ferratis pubescentibus, spicis sessilibus terminalibus, calycibus inflatis villosis.
Teucrium. *Brown. jam.* 257.
India Occidentalis, Jamaica. ♃.

STACHYS.

patens. 6-7. S. ramosissima, ramis filiformibus patentibus, foliis lanceolatis serratis glabris, floribus subverticillatis.
Hispaniola. ♄.

CLINOPODIUM.

capitatum. 2-3. C. foliis planis glabris, capitulis axillaribus pedunculatis. Clinopodium. 1. *Brown. jam.* Melissa altissima globularia. *Plum. ic.* t. 163. f. 2.
Sideritis. *Sloan. jam.* 65. h. 1. p. 174. t. 109. f. 2.
Scabiosæ affinis. *Pluk. alm.* 355. t. 222. f. 7.
Hyptis. *Jacq. ic.*
Jamaica. ☉.

PHLOMIS.

Martinicensis. 9-10. P. involucris setaceis, verticillis subglobosis, calycibus recurvis, lacinia sup. subulata longissima, foliis ovato-oblongis villosis. *
Jacq. ic. Clinopodium martinicense.
Jacq. am. 160. t. 177. f. 75.
Martinica. etc.

THY-

THYMUS.

Brownei. 1–2. S. foliis orbiculatis crenatis, floribus pedunculatis axillaribus. Thymus 1. *Brown. jam.* 259.
Jamaica. ☉. ♃.

SCUTELLARIA.

purpurascens. 11–12. S. foliis petiolatis cordato-ovatis dentatis, racemis nudis terminalibus, corollis labio utroque trifido. ♃
Guadeloupe.

ANGIOSPERMIA.

GESNERIA.

Craniolaria. 3. G. foliis cuneatis oblongis dentato-laciniatis; pedunculis terminalibus, corollis campanulatis. Craniolaria fruticosa. *Linn.* Gesneria arborescens amplo flore — *Plum. gen.* 27. t. 137.
Hispaniola. ♄.

grandis. 3. G. foliis lato-lanceolatis longissimis denticulatis superne hirtis infra scabris; pedunculis terminalibus, caule arborescente.
Jamaica. ♄.

scabra. 3. G. foliis ovato-lanceolatis serratis scabris, pedunculis axillaribus, corollis cylindricis recurvis.
Jamaica. ♄.

corymbosa. 1–2. G. foliis ovatis acutis serratis scariosis asperis, pedunculis multipartitis, floribus corymbosis.
Jamaica. ♄.

exserta. 3. G. foliis ovato-lanceolatis crenatis glabris, pedunculis trifloris, genitalibus corolla duplo longioribus, capsulis ovatis.
Jamaica. ♄.

calycina. 3. G. foliis lanceolato-ovatis acuminatis ferratis glabris, ped. 3-floris, genitalibus corolla longioribus, calycibus campanulatis, capſ. cylindricis.
Jamaica. ♄.

ventricoſa. 3. G. foliis ellipticis acuminatis crenatis glabris, ped. ſub 4-floris, laciniis calycis ſubulatis elongatis, corollis ventricoſis. *
Jamaica, *Montſerrat*, *Dominica.* ♄.

pulchella. 3. G. herbacea, foliis ternatis ovatis acutis ſerratis villoſis, pedunculis axillaribus unifloris. Achimenes 2. *Brown. jam.* 270. t. 30. f. 1.
Columnea erecta. *Lamarck. Encycl.* 2. p. 66. n. 2.
Jamaica. ☉.

pumila. 3. G. acaulis, foliis ovato-cuneiformibus crenatis ſubſeſſilibus, ped. ſubbifloris foliis brevioribus.
Jamaica.

BRUNFELSIA. Linn. (xl.)

Calyx 5-dentatus. *Cor.* tubo longiſſimo. *Bacca* 1-locularis polyſperma, *conceptaculo* maximo.
(pone *Beſleriam.*)

undulata. 2. B. foliis lanceolato-ovatis utrinque attenuatis, petiolis breviſſimis, corollis tubo curvo, limbo undulato.
Jamaica. ♄.

americana. 1. B. *foliis ellipticis acuminatis, petiolis longioribus, corollis tubo erecto, limbo integro.* Linn.
India occidentalis, *Jamaica.* ♄.

BIG-

BIGNONIA.

longisſima. 1–2. B. arborea, foliis ſimplicibus oblongis acuminatis, floribus 2-dris, ſiliquis ſiliformibus, ſeminibus lanatis. B. longisſima *Jacq. am.* 182. t. 176. f. 78. *Plum. ſp.* 5. *ic.* 57. Bignonia 2. *Brown. jam.* 264. Bignonia Qvercus *Lamarck Encycl.* 417. 2. *India occidentalis.* ♄.

alliacea. 4–5. B. foliis conjugatis: foliolis ellipticis integris coriaceis, pedunculis 5-floris axillaribus, calycibus integris. * B. alliacea *Aubl. gvian.* 659. 14. *Barr. Gall. æqvin.* 23. *India occidentalis.* ♄.

echinata. 9–10. B. foliis inferioribus ternatis, ſuperioribus conjugatis, petiolis dichotomis cirrhoſis; fructibus echinatis. * B. echinata *Jacq.* h. 183. t. 176. f. 52. *Aubl. gvian.* 648. t. 263. 264. *India occidentalis.* ♄.

CITHAREXYLON.

erectum. 1–2. C. ramis teretibus, racemis erectis terminalibus, calycibus dentatis. Citharexylon 5. *Brown. jam.* t. 28. f. 2. Berberis fructu, arbor maxima — *Sloan.* h. 99. t. 206. f. 3. 4. *Jamaica.* ♄.

ſubſerratum. 4. C. ramis 4-gonis, racemis axillaribus nutantibus, calycibus dentatis, foliis ellipticis ſubſerratis venoſis. *Hiſpaniola.* ♄.

melanocardium. 4. C. ramis tetragonis, racemis terminalibus compoſitis, floribus tetrandris. Citharexylon 2. *Brown. jam.* 265.

TANÆCIUM. (XXV.)

Calyx cylindraceus, truncatus.
Corolla tubuloſa, ſubæqvalis, 5-fida.
Rudimentum filamenti 5 ti.
Bacca corticoſa maxima.
(ante *Cal. 2fidos.*)

Iaroba

Iaroba. 1. T. foliis inferioribus ternatis, ſuperioribus geminatis, cirrhis interpetiolaribus terminalibus; caule ſcandente. Iaroba. *Marcgr. braſ.* 25. *Piſ.* 173. Creſcentia? 6. *Brown. jam.* 266. Cucurbitifera fruticoſa 3-folia—*Sloan. jam.* 207. h. 2. p. 175.
Jamaica. ♄.

paraſiticum. 2. T. foliis ovatis coriaceis, caule ſcandente fruticoſo radicante. Creſcentia? 5. *Brown. jam.* 265.
Jamaica. ♄.

LANTANA.

ſtricta. 3–4. L. foliis oppoſitis oblongo-lanceolatis acutis, caule inermi; capitulis ſubrotundis, bracteis ovato-lanceolatis ſquarroſis.
Periclymenum rectum ſalviæ folio. *Sloan.* h. 2. 84. t. 195. 4.
Jamaica. ♄.

radula. 3–4. L. foliis oppoſitis ovatis acutis ſerratis rugoſis aſperis, ſubtus hirſutis, caule ſubinermi aſpero; capitulis oblongis, bracteis ovatis acutis.
India occidentalis. ♄.

LINDERNIA.

dianthera. 2. L. foliis petiolatis ovato-ſubrotundis ſubſerratis, caule repenti. Erinus procumbens. *Mill. dict.*
Hiſpaniola. ☉.

BUCHNERA.

elongata. 1–2. B. foliis integris oppoſitis, calycibus piloſiuſculis, fructu longioribus.
Ageratum folio & facie Rapunculi. *Plum. ic.* 19. t. 17. Peripea paluſtris. *Aubl. guian.* 627. t. 253.
India occidentalis, Jamaica.

LIPPIA.

cymoſa. 5. L. floribus cymoſis, foliis ovatis ſubintegris. Spiræ congener ſpinoſa, folio ſubrotundo acuminato integro — *Sloan.* h. 2. 30. t. 174. f. 3. 4.

RUELLIA.

Blechioides. 1–2. R. foliis oblongis ſubdentatis glabris, ſpicis ovatis, floribus bracteis longioribus. *Jamaica.* ♄.

anguſtifolia. 1–2. R. foliis lineari-lanceolatis, ſpicis oblongis, bracteis ovatis hirſutis. *
India occidentalis.

rupeſtris. ? R. acaulis, foliis petiolatis oblongis crenato-undulatis, ſcapis erectis multifloris.
Hiſpaniola. ♃.

VITEX.

umbroſa. 3–4. V. foliis quinatis integerrimis, utrinque glabris, racemis compoſitis axillaribus.
Jamaica. ♄.

divaricata. 2–3. V. foliis ternatis integerrimis utrinque glabris, paniculis dichotomis divaricatis. *
St. Crux, Chriſtopher. ♄.

COLUMNEA. Linn.

Cal. 5-phyllus.
Cor. ringens, labio ſup. 3-partito, intermed. fornicata; ſupra baſin gibba.
Antheræ connexæ.
Capſ. 1-locularis. *Sem.* nidulantia.
(pone *Beſleriam.*)

Virſu-

hirſuta. 2. C. foliis ovatis acuminatis ſerratis ſuperne hirtis, foliolis calycinis denticulatis lanceolatis, corollisque hirſutis, labio ſuperiori bifido. Achimenes 1. *Brown. jam.* 270. t. 30. f. 3. Rapunculus fruticoſus — *Sloan.* h. 1. p. 157. t. 100. f. 1.
Jamaica. ♄.

hiſpida. 3. C. foliis ovatis obtuſis denticulatis hiſpido-hirſutis, foliolis calycis lanceolatis integris piloſis; caule piloſo ſcabro.
Jamaica. ♄.

rutilans. 4. C. foliis ovato-lanceolatis villoſis denticulatis; foliis calycis laciniatis, corollis villoſis, labio ſuperiori bipartito.
Jamaica. ♄.

ſcandens. 1. C. *foliis ovatis acutis integris ſubvilloſis, foliolis calycis integris, corollisque pubeſcentibus, labio ſuperiori indiviſo. Plum. gen.* 28. *ic.* 89. f. 1. Columnea ſcandens. *Linn. Jacq. hort.* III. 27. h. 48.

TAMONEA. Aublet. (XL.)

Cal. 5-ariſtatus. *Cor.* ringens, limbo 5-fido. *Nux* carnoſa 4-locularis. *Sem.* ſolitaria.
(pone *Pedalium.*)

ſpinoſa. 1. T. fructibus 4-ſpinoſis.
Verbena curaſſavica *Linn.* Kæmpfera. *reliq. Houſt.* t. 2.
India occidentalis, Antigua, Curacao. ⊙.

muticat 2. T. fructibus muticis. * Tamonea ſpicata. *Aubl. guian.* 660. t. 268.
Guiana, Cayenna. ⊙.

CLAS-

CLASSIS XVI.

MONADELPHIA.

DIANDRIA.

OMPHALEA. Linn.

♂. *Cal.* 4-phyllus. *Cor.* nulla.

MONOIC. *Filamentum* columnare cui *antheræ* apice insidentes.

♀. *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* nulla.
Stigma trifidum. *Capsula* carnosa trilocularis.

axillaris. 3. O. racemis axillaribus; foliis distichis ovatis acuminatis nitidis petiolis brevissimis, stipulis mucronatis, caule fruticoso.
Jamaica. ♄.

cauliflora. 4. O. racemis caulinis basi squamosis, foliis distichis oblongis acutis nitidis, caule arborescente.
Jamaica. ♄.

cordata. 1. O. *racemis compositis foliosis terminalibus, foliis sparsis cordatis subtus villosis, basi biglandulosis, caule scandente.* Omphalea diandra. *Linn.*

nucifera. 2. O. *racemis compositis foliosis terminalibus, foliis sparsis oblongis glaberrimis basi biglandulosis, caule arboreo.* O. triandra. *Linn.*

TRIGYNIA.

GYMNANTHES. (xxxviii.)

DIOIC. MONOIC. ♂. *Amentum* nudum. *Per.* O. *Cor.* O. *Stam.* pedicelli 3-partiti l. 3-chotomi. antheriferi.

♀. *Amentum.* l. *Germen* pedicellatum.
Cor. O. *Stylus* 3-fidus.
Capsula 3-cocca 3-locularis.
(pone *Iuniperum.*)

elliptica

elliptica. 1. G. dioica, ſtaminibus 3-partitis, ſemineis amentaceis.
Jamaica. ♄.

lucida. 2. G. monoica, ſtaminibus 3-chotomis, ſemineis ſolitariis pedicellatis.
Hiſpaniola. ♄.

MYRISTICA. (XVI.)

DIOIC. ♂. *Cal.* 3 fidus. *Cor.* nulla.
Filamentum columnare.
Antheræ terminales, coalitæ.
♀. *Cal.* 3 fidus. *Cor.* nulla.
Capſula ſupera, drupacea, bivalvis.
Nux macide involuta.

fatua. 3. M. foliis oblongo-lanceolatis, ſubtus pubeſcentibus, calycibus fructibusque villoſis.
Tobago. ♄.

febifera. 2. M. foliis cordatis oblongis ſubtus fructibusque tomentoſis. * Virola febifera. *Aubl. guian.* 904. t. 345.
Guiana. ♄.

aromatica. 1. M. *foliis ellipticis ſubtus pubeſcentibus, calycibus ovatis, fructibus lævibus.* †)

PEN-

†) Hæc vera eſt arbor *Nucis moſchatae*, cujus characterem ignoravit dum vixit Cel. a Linné, in Suppl. plantarum a Sonnerario forte deceptus. Flores mihi quamplurimi viſi, ab Indiæ orientalis Banda & Isle de France allati, in Muſeo Ill. Jos. Banks optime in ſpiritu vini aſſervati; ideoque certior factus de fructificatione hac ſingulari, primum ab Equ. Thunbergio in Act. Holm. 1782. p. 46. delineata, licet Ille antheram unicam filamentum cingentem deſcripſit; Numerus antherarum in *M. aromatica* vix diſtinguendus, quia ſulcis polliniferis aſſimilantur, nec ut in M. *fatua* & *febifera* magis diſtinctæ. Aubletius quidem Virolam ſuam depinxit hexandram; quod vero falſum & natura incongrum ex ſpeciminibus ipſius diligenter examinatis atteſtari poſſum.

PENTANDRIA.

AYENIA.

lævigata. 1–2. A. foliis ovatis integris glaberrimis; germine pedicellato, nectario decemfido radiato.
Jamaica. ♄.

PASSIFLORA.

anguſtifolia. 8–9. P. foliis indiviſis ſubcordatis lanceolatis integris, petiolis 2-glanduloſis, floribus ſolitariis.
Jamaica. ♄.

oblongata. 16–17. P. foliis ellipticis, antice ſubtrilobis ſubtus punctatis, lobis acutiuſculis, intermedio breviori.
Jamaica. ♄.

parviflora. 18–19. P. foliis trilobis glabris: lobis ovatis integris, intermedio producliore, petiolis 2-glanduloſis; caule herbaceo.
Jamaica. ♃.

MELOCHIA.

venoſa. 3–4. M. pedunculis diſtinctis terminalibus multifloris, foliis ovatis ſerratis venoſis ſubtus tomentoſis, caule piloſo. Sida 17. *Mill. dict.*
Jamaica. ♄.

nodiflora. 4–5. M. floribus conglobatis axillaribus, capſulis globoſis, foliis ovatis acuminatis glabris, Abutilon fruticoſum — *Sloan.* h. 1. p. 219. t. 135. 2.
Jamaica. ♄.

lupulina. 4–5. M. racemis confertis axillaribus, calycibus inflatis membranaceis, foliis ovato-cordatis inciſo-ſerratis ſubtus tomentoſis.
Jamaica. ♄.

OCHROMA. (XXXVII. æ.)

Cal. duplex: exterior 3-phyllus.
Antheræ connatæ, anfractuoſæ.
Capſula 5-locularis, polyſperma.
(pone *Melochiam.*)

Lagopus. 1. OCHROMA.
Hibiſcus 10. *Brown. jam.* 286. Cotonnier ſiffleux *Nicol. Doming.* p. 223.
Goſſypium 1. Xylon arboreum *Pluk. alm.* t. 189. f. 2.
Jamaica, Hiſpaniola. ♄.

OCTANDRIA.

ALCHORNEA. (XXXVIII.)

DIOIC. ♂ *Calyx.* 3–5–phyllus. *Cor.* nulla.
♀ *Cal.* 5–dentatus. *Cor.* O.
Stylus 2–partitus.
Capſula baccata, 2–cocca.

Ilicifolia. 1. ALCHORNEA.
Jamaica. ♄.

DECANDRIA.

HELICTERES.

jamaicenſis 1–2. H. foliis cordatis acutis ſerratis, fructu ovato acuto contorto. H. jamaicenſis *Jacq. am.* 235. t. 179. f. 99. Helicteres Isora. b. *Linn.* *Jamaica.* ♄.

IATROPHA.

divaricata. 2–3. I. foliis ovatis acuminatis integris glaberrimis, racemis divaricatis.
Jamaica. ♄.

DODECANDRIA.

STERCULIA.

Jvira. 1–2. S. hermaphrodita, foliis ovatis 3-lobisve, floribus paniculatis, capſulis qvinque. ✲
Ivira pruriens *Aubl. gvian.* 694. t. 279.
India occidentalis. ♄.

ACA-

ACALYPHA.

* *Monoicæ.*

Hernandifolia. A. spicis femineis longissimis, involucris cordatis serratis, masculis distinctis aphyllis; foliis subcordatis serratis, petiolis longissimis.
Jamaica. ♄.

Corensis. A. floribus femineis terminalibus distinctis, involucris triphyllis, spicis masculis axillaribus involucratis, foliis ovatis serratis. * A. corensis. *Jacq. am.* 254. t. 161.
India occidentalis. ♄.

lævigata. A. spicis femineis involucris multipartitis, spicis masculis laxis aphyllis, foliis cuneato-ovatis acuminatis serrulatis glaberrimis.
Jamaica ♄.

elliptica. A. spicis femineis involucris germinibus brevioribus ovatis dentatis hirsutis; masculis aphyllis laxis; foliis ellipticis acuminatis dentatis.
Jamaica. ♄.

reptans. A. spicis terminalibus erectis, floribus mixtis, femineis inferioribus, involucris cordatis serratis, masculis aphyllis, foliis ovatis serratis, caule reptante. Urtica minor iners spicata — *Sloan. hist.* 1. 125. t. 82. f. 3.
Jamaica, *Hispaniola.*

tomentosa. A. spicis femineis terminalibus solitariis, involucris multipartitis, masculis erectis, foliis ovato-lanceolatis serratis scabris subtus villoso-tomentosis.
Hispaniola. ♄.

angustifolia. A. floribus femineis subsessilibus terminalibus, involucris serratis; masculis spicatis, foliis linearibus serratis.
Hispaniola. ♄.

** *Dioicæ.*

scabrosa. A. spicis femineis involucris cordatis incisis, foliis oblongo-lanceolatis serratis scabris.
Jamaica. ♄.

betulæfolia. A. floribus femineis axillaribus ſeſſilibus, involucris cordatis crenatis, maſculis ſpicatis, foliis ſubrotundis crenatis glabris.
Jamaica. ♄.

CROTON.

ſeſſiliflorum. 5–6. C. foliis ovatis acuminatis integerrimis glabris, floribus ſeſſilibus axillaribus dioicis 5-dris.
Hiſpaniola. ♄.

globoſum. 5–6. C. foliis ovatis obtuſis integris, pedunculis geminis, floribus dioicis; fructibus globoſis echinato-hiſpidis.
Jamaica. ♄.

Eluteria. 5–6. C. foliis ovatis acuminatis integerrimis ſparſis glabris ſquamuloſis, ſubtus argenteis, caule arboreo; racemis compoſitis axillaribus.
Clutia eluteria Linn.

divaricatum. 8–9. C. foliis oblongis obtuſis ſerratis hirtis, baſi biglandulofis, racemis terminalibus ſolitariis caule fruticoſo, ramis dichotomis divaricatis.
India occidentalis. ♄.

nitens. 9–10. C. foliis cordato-ellipticis acuminatis ſubintegris glabris ſupra nitidis, ſubtus punctatis argenteis; racemis axillaribus foliis brevioribus erectis.
Jamaica. ♄.

Laurinum. 9–10. C. foliis oblongis acutis integerrimis conſiſtentibus glabris, petiolis ſcabris foliisque ſubtus punctatis; racemis axillaribus longiſſimis patulis; caule arboreſcente.
Jamaica. ♄.

pallens. 9–10. C. foliis ovatis acuminatis integerrimis utrinque glabris, racemis ſolitariis erectis terminalibus; calycibus fructu majoribus. C. fruticoſum *Mill.*
India occidentalis. ♃.

macrophyllum. 9–10. C. foliis cordato-ſubrotundis acuminatis integris craſſis tomentoſis, ſubtus nervoſis. *
India occidentalis. ♃.

populi-

populifolium. 10–11. C. foliis lato-ovatis acuminatis ferrato-dentatis subhirtis, petiolis longitudine foliorum; racemis terminalibus erectis solitariis.
India occidentalis, Jamaica. ♃.

POLYANDRIA.

CAROLINEA.

insignis. 2. C. foliis subseptenatis, foliolis obovato-oblongis. *
Xiloxochitl flore capillaceo. *Hern. mex.* 68.
Tobago, Vera Cruz. ♄.

princeps. 1. C. *foliis subquinatis, foliolis ovato-lanceolatis,* C. princeps. *Linn.*

SIDA.

arguta. 14–15. S. foliis cordatis serratis apice attenuatis; caule virgato, pedunculis axillaribus filiformibus unifloris. *Mill. dict.*
Jamaica. ♄.

althæifolia. 16–17. S. foliis cordatis subangulatis obtusis serrato-crenatis utrinque tomentosis, rostris seminum calyce brevioribus.
Althæa flore luteo, *Sloan.* h. p. 218. t. 136. f. 2.
Jamaica. ♄.

dumosa. 13–14. S. foliis cordatis acuminatis serratis utrinque glabris, floribus paniculatis.
Jamaica. ♄.

procumbens. 3–4. S. foliis cordatis ovato-subrotundis serratis villosis, caulibus procumbentibus hirsutis.
Hispaniola,

ALTHÆA.

corymbosa. 1–2. A. foliis simplicibus cordatis angulatisve glabris, pedunculis calycibusque pilosis, floribus corymbosis.
Hispaniola. ♄.

racemosa, 1–2. A, foliis simplicibus cordatis ovatis serratis superne scabris, racemo terminali erecto. Althæa 3. *Brown. jam.* 284. Alcea fruticosa aqvatica–*Sloan* h. 221. t. 139. f. 2. Pavonia spicata. *Cavanilles diss.* 3. p. 136. t. 46. f. 1.
Jamaica, ♄.

HIBISCUS.

elatus, 10–11. H, foliis cordatis subrotundis integris; pedunculis brevissimis unifloris, calyce 10-dentato. Hibiscus 1. *Brown. jam.* 284 Malva arborea–*Sloan*, h. 1, 93. t. 134. f. 2. 3.
Jamaica. ♄.

ACHANIA. (XXXVII. x.)

Cal duplex : *exterior* polyphyllus.
Cor. convoluta.
Bacca 5-sperma.

(pone *Hibiscum.*)

Malvaviscus, 1. A, foliis scabriusculis acuminatis, foliolis calycis exterioris erectis. Hibiscus malvaviscus *Linn.* Malva arborea *Sloan*, h. 1. 210. t. 136. f. 1.
Malvaviscus arborea. *Cavanilles diss.* 3. p. 131. t. 48. f. 1.

pilosa, 2. A, foliis pilosis obtusis acutisque.
Jamaica. ♄.

MYRODIA.

Calyx simplex, monophyllus.
Cor. 5 petala. *Pist.* 1.
Columna antherifera indivisa.
Drupa sicca : *Nuces* binæ.

(inter *Mesuam* & *Morisonam.*)

turbinata. 1. M, foliis ellipticis, calycibus turbinatis intus subsericeis. *
Montserrat, Lucia, Christoph. ♄.

longi-

longiflora 2. M. foliis oblongis, calycibus cylindraceis intus villosis, staminum columna longissima. * Quaranibea guianensis. *Aubl. guian.* 692. t. 278. *Cavanill. diss.* 3.
Guiana. ♄.

PINUS.

Occidentalis. 4–5. P. foliis 5-nis margine scabris longissimis; conis oblongis, squamis apice truncatis. Pinus foliis quinis scabris. *Plum.* p. 154. t. 161.
Hispaniola. ♄.

CLASSIS XVII.

DIADELPHIA.

OCTANDRIA.

SECURIDACA.

virgata. 3. S. caule ſcandente, ramis virgatis, foliis ſubrotundis. *Securidaca* 1. *Brown. jam.* 287. Spartium alterum ſcandens, fructu alato, flore variegato. *Plum. H. mſs.* h. 2. p. 213. ic. 144. f. 1.
Hiſpaniola. ♄.

DECANDRIA.

AMERIMNON. Brown. (XXXII).

Calyx bilabiatus.
Legumen compreſſo-foliaceum 2-valve, dehiſcens. *Semina* aliqvot ſolitaria.
(poſt *Pterocarpum*).

Brownei. 1. A. inerme, foliis petiolatis alternis ſubcordato-ovatis, racemis compoſitis axillaribus lateralibusque. Amerimnon. 1. *Brown. jam.* 288. Tab. 31. f. 3. *Jacq. amer.* 199. t. 180. f. 58.
Jamaica. ♄.

Ebenus. 2. A. ſpinoſum, foliis ſubſeſſilibus aggregatis obovato-oblongis, pedunculis biſloris. Pterocarpus ſeſſilifolius *Linn.* P. buxifolius, *Murr.* Aspalathus Ebenus *Linn.* Brya, *Brown. jam.* Spartium *Sloan.* h. 2. 30. t. 175. f. 1. Ebenus. *Pluk.* Spartium arboreſcens, *Mill. dict.*

TERAM-

TERAMNUS. (XXXII).

Carina minima, calyce recondita.
Stam. alterna; 5 ſterilia.
Stigma ſesſile, capitatum.
(pone *Amorpham.*)

volubilis. 1. T. foliis ovato-lanceolatis pubeſcentibus. *Dolichos uncinatus. Linn.* Teramnus 1. *Brown. jam.* 290. Phaſeolus ſylveſtris minor, flore minori. *Sloan.* h. 1. p. 182. *Jamaica.* ♄

uncinatus. 2. T. foliis oblongis obtuſis, ſubtus ſericeis. *Jamaica.* ♄.

DOLICHOS.

roſeus. 31. D. caule repente adſcendente, foliol's ſubrotundis nitidis, floribus racemoſis, leguminibus dorſo 3-carinatis. Dolichos maritimus repens. *Brown. j.* 293. 4.

luteus. 26-27. D. volubilis, floribus ſubſpicatis, leguminibus ſubcylindricis glabris, foliis ſubrotundo-rhombeis obtuſis integris glabris. *Jamaica.* ♄.

GLYCINE.

phaſeoloides. 6-7. G. foliis ternatis, ſubtus villoſis, racemis terminalibus. Glycine 2. *Brown. jam.* 296. Phaſeolus florum ſpica pyramidata, ſemine coccineo, nigra macula notato. *Plum. Cat.* 12. *Jamaica, Domingo.* ♄.

reticulata. 11-12. G. foliis ternatis oblongo-lanceolatis pubeſcentibus, ſubtus reticulato-venoſis, racemis axillaribus ſubſeſſilibus, leguminibus oblongis compreſſis. *Jamaica* ♄.

CLITORIA.

multiflora. ? C. foliis pinnatis, foliolis oblongis subtus sericeis, racemis axillaribus multifloris.
Domingo. ♄.

GEOFFRÆA.

inermis. 2. G. inermis, foliolis lanceolatis.
Geoffræa inermis jamaicensis. *Wright. Act. Lond.* 1777. *vol.* 67. p. 512. t. 10.
India occidentalis, Jamaica. ♄.

spinosa. 1. G. *spinosa, foliolis oblongis obtusis.* G. spinosa *Linn. Jacq.*

ROBINIA.

sepium. 1–2. R. inermis, pedunculis racemosis, partialibus bifloris; foliis impari-pinnatis, pinnis ovatis acuminatis.
R. sepium. *Jacq. am.* 211.
Hispaniola. ♄.

HEDYSARUM.

adscendens. 17–18. H. foliis ternatis subrotundis subtus pubescentibus, caule tereti, ramis declinatis adscendentibus pilosis; racemis simplicibus erectis axillaribus.
Jamaica. ♄.

supinum. 20–21. H. foliis ternatis ovatis obtusiusculis, subtus incano-villosis, caule ramoso procumbente; racemis simplicibus erectis terminalibus.
Hedysarum triphyllum supinum — *Sloan.* h. 185. t. 118. f. 2.
Jamaica. ♄.

in-

incanum. 20–21. H. foliis ternatis ovatis acuminatis subtus incanis, caule tereti ramoso erecto; racemis terminalibus erectis, legum. declinatis hirtis. H. canescens *Mill. dict.* Hedysarum fol. 3–natis ovatis. *Plum. ic.* 149. f. 1.
Jamaica, Hispaniola. ♄.

trigonum. 21–22. H. foliis ternatis ovatis acutis hirtis, caule scandente 3–quetro; racemis longissimis axillaribus, legum. tortuosis inflexis.
Hedysarum. 7. *Brown. jam.* 301. H. intortum. *Mill. dict.*
Jamaica, Hispaniola.

scorpiurus. 25–26. H. foliis ternatis oblongis, subtus hirsutis, caulibus procumbentibus 3–gonis, racemis axillaribus, legum. tereti-usculis erectis.
Hedysarum. 9. *Brown. jam.* 301.
Hispaniola, Jamaica.

tortuosum. 28–29. H. foliis ternatis ovali-oblongis obtusis glabriusculis, racemis erectis axillaribus, leguminibus tortuosis compressis pubescentibus.
Hedysarum 8. *Brown. jam.* 301. Hedysarum triphyllum — *Sloan.* h. 1. 184. t. 116. f. 2.
India occidentalis. ♄.

spirale. 28–29. H. foliis ternatis ovatis obtusis glabris, caule ramosissimo, ramis diffusis; racemis laxis divaricatis, legum. spirali-tortuosis.
H. procumbens. *Mill. dict.*
Jamaica. ♄.

axillare. 29–30. H. foliis ternatis rhombeo-subrotundis, caule repente radicante, petiolis erectis; scapis axillaribus foliis longioribus.
Hedysarum 6. *Brown. jam.*
Jamaica, Domingo.

AESCHYNOMENE.

sensitiva. 2–3. AE. caule fruticoso glebro, foliolis obtusis, leguminibus lævibus obtusis, stipulis acutis deciduis. * Hedysarum arboresc. foliis mimosæ. *Plum. cat.* 1. *ic.* 149. *f.* 2.
India occidentalis. ♄.

GALE-

GALEGA.

toxicaria. 3-4. G. ſpicis terminalibus pedunculatis, leguminibus teretibus pedicellatis patentibus, caule foliolisque incano-tomentoſis. Cytiſus. 2. *Brown. jam.* 296.
Galega fruteſcens, fol. ſericeis. *Plum. ic.* 126. t. 135.
India occidentalis. ♄.

STYLOSANTHES.

Calyx tubulatus, longisſimus, corollifer.
Germen ſub corolla.
Legumen biarticulatum, hamatum.
(pone *Aeſchynomenem.*)

procumbens. 1. S. foliis ternatis acuminatis lineatis glabris, ſpicis multifloris, caule procumbente. Hedyſarum hamatum. æ. *Linn.* Trifolium 1. *Brown. jam.* 298. Anonis non ſpinoſa major glabra — *Sloan.* h. 1. 178. t. 119. f. 2. *Jamaica, Hiſpaniola.* &c.

viſcoſa. 2. S. foliis ternatis ovatis ciliatis hirſutis, ſpicis paucifloris, caule erecto.
Hedyſarum hamatum. b. *Linn.*
Trifolium 2. *Brown. jam.* Loto 5-phyllo ſiliquoſo ſimilis, non ſpinoſa — *Sloan.* h. 1. 186. t. 119. f. 1.
Jamaica.

CLAS-

CLASSIS XVIII.

POLYADELPHIA.

POLYANDRIA.

SYMPLOCOS.

Cal. 5-fidus ſuperus. *Cor.* 5-8-petala.
Stamina 4-plici ſerie tubo corollæ accreta.
Fructus (Drupa) 5-locularis, polyſperma.

(poſt *Hopeam.*)

octopetala. 2. S. floribus octopetalis.
Jamaica. ♄

martinicenſis. 1. S. *floribus 5-petalis.* Linn. Jacq.

CLASSIS XIX.

SYNGENESIA.

POLYGAMIA AEQUALIS.

SONCHUS.

agreſtis. 4-5. S. pedunculis tomentoſis multifloris, calycibus glabris, caule ſtriato, foliis incifo-ſerratis ſeſſilibus.
Sonchus lævis *Sloan. cat.* 122. h. 255.
Jamaica. ☉.

SPILANTHUS.

uliginoſa. 3-4. S. foliis ovato-lanceolatis crenatis, caule erecto dichotomo, pedunculis terminalibus, floribus radiatis.
Jamaica. ☉.

BIDENS.

hirſuta. 10-11. B. foliis oppoſitis ovato-lanceolatis integris tomentoſo-hirſutis, caule ſcandenti frutico-ſo, pedunculis oppoſitis divergentibus multifloris. Eupatorium jam. foliis oblongis, ſubtus — *Sloan.* h. 1. 257.
Jamaica. ☉.

CACALIA.

ruderalis. 14-15. C. caule herbaceo ramoſo, foliis lanceolatis integris glaucis.
Kleinia ruderalis. *Jacq. am.* 215. t. 127.
Jamaica. ☉.

ETHU

ETHULIA.

Struchium. 1–2. E. floribus axillaribus ſeſſilibus, omnibus trifidis. Struchium 1. *Brown. jam.* 312. t. 34. f. 2.
Jamaica. ☉.

EUPTATORIUM.

parviflorum. 1. E. fruticoſum, foliis ovato-lanceolatis ſerratis glabris, corymbis patentibus, calycibus trifloris.
Jamaica. ♄.

nervoſum. 17–18. E. foliis elliptico-lanceolatis attenuatis dentatis triplinerviis utrinque glabris, calycibus multifloris.
Jamaica. ♄.

rigidum. 17–18. E. foliis petiolatis ovatis acutis ſerrato-dentatis rigidis ſubtus ſcabris; caule ſubherbaceo.
Jamaicâ.

molle. 18–19. E. foliis petiolatis cordatis acutis ſubſerratis pubeſcentibus; caule herbaceo tomentoſo.
Ageratum gvianenſe. *Aubl.* gv. 800. 3.
India occidentalis, Jamaica. ☉.

villoſum. 18–19. E. foliis oppoſitis decuſſatis, ovatis acutis ſubſerratis ſubtus villoſo-tomentoſis, calycibus 8–15-floris, caule fruticoſo. Conyza fruticoſa ciſti odore. *Sloan* h. 1. 257. t. 161. f. 2.
Jamaica, Domingo. ♄.

cordifolium. 18–19. E. foliis cordatis ſerratis ſubtus tomentoſo-hirſutis, petiolis breviſſimis; corymbis ſubſeſſilibus, calycibus ſqvarroſis; caule fruticoſo.
Jamaica. ♄.

montanum. 18-19. E. foliis cordatis acutis denticulatis petiolatis ſcabris ſubtus hirſutis; corymbis patentibus, caule fruticoſo.
Jamaica. ♄.

LAVE-

LAVENIA. (XLIX. compos. E).

Receptaculum nudum.
Pappus 3-aristatus, apice glandulosus.
Calyx subæqvalis. *Stylus* 2-fidus.

(inter *Eupatorium* & *Ageratum*.)

decumbens. 1. L. caule simplici decumbente, foliis subcordatis obtuse serratis.
Cotula verbesina. *Linn.*
Jamaica. ☉.

erecta. 2. L. *Caule ramoso erecto, foliis ellipticis argute serratis.* Soland. *
Verbesina Lavenia. *Linn.* Adenostema *Forst.*

POLYGAMIM SUPERFLUA.

GNAPHALIUM.

albescens. 32–33. P. herbaceum, niveo-tomentosum, foliis linear-lanceolatis, caule erecto, inferne indiviso, ramis terminalibus fastigiatis, floribus confertis conicis.
Jamaica. ♄.

americanum. 37–38. G. herbaceum, foliis radicalibus lingulato-lanceolatis subtus niveis, caule simplici erecto tomentoso, floribus spicatis lateralibusque sessilibus confertis. Gnaphalium amer. *Mill. dict.* Gnaphalium ad stoechadem citrinam accedens. *Sloan. cat. jam.* 125. Gnaphalium 1. *Brown. jam.* 318.
Jamaica. ☉.

CONYZA.

purpurascens. 15–16. D. foliis ovato-lanceolatis serratis subtomentosis, caule subherbaceo, inferne simplici superne corymboso, floribus ovatis.
Conyza 1. *Brown. jam.* 318.
Conyza major odorata — *Sloan.* h. 1. 258. t. 152. f. 1.
Jamaica. ☉.

rigida.

rigida. 22–23. C. foliis petiolatis obovatis integris ſcabris ſubtus venoſis; ſpicis flexuoſis, floribus ſecundis geminatis. — *Plum. ic.* 14. f. 1. *Jamaica.* ♄.

CALEA.

lobata. 3–4. C. corymbis congeſtis, foliis alternis ſuperioribus ovato-lanceolatis, inferioribus dentato-haſtatis, ſinuato-ſerratis. Conyza lobata *Linn.*
Santolina. 2. *Brown. j.* 315. Virga aurea major, ſive—*Sloan.* h. 1. 260. t. 152. f. 2. Conyza fol. lobatis haſtatis. *Plum. ic.* 96. *Jamaica.* ♄.

ERIGERON.

rivulare. 8–9. E. foliis cuneatis acutis hirtis apice utrinque dentatis, margine ciliatis, caulinis ſeſſilibus; caule ſimpliciuſculo erecto pauciflore.
Jamaica, Hiſpaniola. ☉.

TUSSILAGO.

albicans. 2–3. T. ſcapo unifloro ebracteato, flore erectiuſculo; foliis lanceolato-ovatis ſubtus tomentoſis obſolete retrorſum ſerratis.
Leontodon tomentoſum. *Linn. ſuppl.* 347.
Jamaica. ☉.

pumila. 2–3. T. ſcapo unifloro ebracteato erecto, foliis lyratis inciſis denticulatis tomentoſis.
Jamaica. ☉.

CINERARIA.

glabra. 8–9. C. floribus corymboſis, calycibus cylindricis; foliis oblongis acutis ſubdenticulatis enerviis, utrinque glabris ſubſucculentis; caule fruticoſo.
Jamaica. ♄.

diſcolor. 8–9. C. floribus corymboſis, foliis oblongo-lanceolatis acuminatis ſubdenticulatis glabris, ſubtus niveo-tomentoſis; caule fruticoſo.
Jamaica. ♄.

PECTIS.

humifuſa. 4. P. foliis ovatis ſubtus punctatis, baſi utrinque ciliatis, caulibus procumbentibus. *
Jacobea humifuſa Hyperici folio. *Plum. cat.* 10. *ic.* 84. t. 95. f. 2.
Guadeloupe, St. Cruz. ☉.

ECLIPTA.

ſeſſilis. 4. E. ? caule erecto, foliis ſubamplexicaulibus ovatis dentatis; floribus axillaribus ſeſſilibus diſcoideis.
Jamaica. ☉.

MATRICARIA.

proſtrata. M. ? foliis ſimplicibus ovatis dentatis, pedunculis lateralibus unifloris; ramis decumbentibus. *
Curaçao.

VERBESINA.

pinnatifida. 3–4. V. foliis alternis pinnatifidis.
Bidens fruteſcens, ſphondylii foliis & facie. *Plum. ſp.* 10. *ic.* 41. t. 51.
Jamaica.

POLYGAMIA NECESSARIA.

MELAMPODIUM.

humile. 3. M. caule erecto, foliis lyrato-dentatis ſeſſilibus.
Jamaica, Domingo. ☉.

TRIXIS

TRIXIS. (XLIX. E.)

Receptaculum paleaceum.
Pappus nullus. *Semina* apice villosa.
Corollulæ radii 3-fidæ.
(post *Melampodium.*)

therebinthina-cea. 1. S. foliis ovatis serrulatis hispidis subtus hirsutis, floribus corymbosis.
Jamaica. ♄.

aspera. 2. T. foliis ovatis basi & apice attenuatis dentato-serratis asperis; floribus paniculatis.
Bailleria aspera. *Aubl. gvian.* 804. t. 317.
India occidentalis. ♄.

erosa. 3. T. foliis lato-ovatis inciso-serratis rugosis scabris, petiolis longioribus.
Dominica, Christopher. ♄.

POLYGAMIA SEGREGATA.

ELEPHANTOPUS.

spicatus. 3. E. foliis ovato-lanceolatis serratis scabris, fasciculis florum sessilibus lateralibus, caule ramoso. E. spicatus. *Juss. Aubl. gv.* 878.
Conyza minor inodora helenii folio. *Sloan.* h. 1. 256. t. 150. f. 4.
Jamaica, Hispaniola. ♃.

angustifolius. 4. E. foliis caulinis linear-lanceolatis integris villosis, floribus glomeratis, fasciculis sessilibus pedunculatisque, caule simplici.
Conyza inodora helenii folio integro angusto. — *Sloan.* h. 1. 256. t. 148. f. 4.
Jamaica. ♄.

TETRANTHUS.

Calyx communis quadriflorus.
Perianth. flosc. proprium monophyllum.
Semina coronata.
Polygamia æqualis.
(post *Echinopen.*)

littoralis. 1. TETRANTHUS.
Hiſpaniola. ☉.

ROLANDRA. Rottboell.

Floſculi faſciculati in capitulum ſquamis interjectis.
Calyx partialis bivalvis, 1-florus.
Corollulæ hermaphroditæ.
Pappus nullus.
(poſt *Echinopen.*)

argentea. 1. ROLANDRA. Rottböll. *Coll. Hafn. med.* II. 256.
Amaranthoid. fruticoſum. — *Sloan.* h. 1. 47. t. 7.
Echinops fruteſcens ad nodos floridus. *Plum. ic.* 114. t. 123.
Echinops fruticoſus. *Linn. Sp. pl. ed.* 1.
India Occidentalis, ♄.

MONOGAMIA.

BRYONIA.

racemoſa. 4–5. B. foliis cordatis trilobis, ſuperioribus ovatis ſcabriuſculis; floribus racemoſis, baccis nutantibus ovalibus. B. racemoſa. *Mill. dict.* Bryonia racemoſa, foliis ficulneis. *Plum. fil.* 83. t. 97.
Jamaica. ♄.

SICYOS.

edulis. 1–2. S. foliis angulatis, baſi cordatis lobatis, fructu oblongo echinato. S. edulis. *Jacq. am.* 258. t. 163. Sechium. *Brown. jam.* 355.
India occidentalis. ☉.

LOBE-

LOBELIA.

acuminata. 17–18. L. caule erecto ſuffruticoſo, foliis lanceolatis attenuatis ſerrulatis; racemo terminali multifloro. Lobelia 2. *Brown. jam.* 322. Rapunculus folio oblongo. *Sloan.* h. 1. t. 95. *Jamaica.*

ſtricta. 17–18. L. caule erecto ſuffruticoſo, foliis inferioribus ovato-lanceolatis glabris, margine denticulato-aculeatis; racemo terminali ſpicato.* *India occidentalis, Gvadeloupe.*

VIOLA.

ſtipularis. 21–22. V. caule ſimplici reptante, foliis ovato lanceolatis crenatis glabris, ſtipulis ciliatis; pedunculis ſolitariis terminalibus. * *India occidentalis, St. Chriſtopher.* ♃.

CLASSIS XX.

GYNANDRIA.

DIANDRIA.

ORCHIS.

monorrhiza. 6–7. O. bulbo ſolitari indiviſo, nectarii labio 3–partito: lateralibus ſetaceis, cornu lineari compreſſo germinis longitudine.
Orchis ſetacea? *Jacq. am.* 220.
Satyrium. 1. *Brown. jam.* 324.
Jamaica, Hiſpaniola. ♃.

SATYRIUM.

[illegible]ium. S. bulbis filiformibus, caule hirſuto, foliis ovatis trinerviis petiolatis vaginantibus, nectario cornuto, labio trilobo.
Jamaica. ♄.

plantagineum. S. *bulbis filiformibus, caule glaberrimo, foliis ovatis petiolatis vaginantibus, nectarii cornu incraſſato, labio 2-lobo, medio acuminato.*
S. plantagineum *Linn.*

elatum. S. bulbis faſciculatis, foliis radicalibus oblongis petiolis longiſſimis, ſcapo vaginato, nectario cornuto adnato, labio deflexo 2–lobo emarginato.
Jamaica, Hiſpaniola. ♃.

Orchioides. S. bulbis faſciculatis oblongis, foliis lato-lanceolatis, ſcapo vaginato, nectario cornuto, labio lanceolato acuminato. Satyrium 7. *Brown. jam.* 325.
Jamaica. ♃.

ſpirale. S. bulbis faſciculatis oblongis, foliis linearibus, ſcapo vaginato, floribus ſpirali-ſecundis, labio trilobo, medio majori crenulato.
Jamaica. ♃.

elatum.

elatum. S. bulbis fasciculatis crassis tomentosis, foliis radicalibus ovatis petiolatis, caule subnudo; nectario subtrilobo. Satyrium. 2. *Brown. jam.* 324. Helleborine foliis liliaceis, radice asphodeli minori. *Plum. ic.* 190.
Jamaica, Hispaniola. ♃.

MALAXIS. Solandr. (vii.)

Nectarium monophyllum, concavum, cordatum, postice acuminatum antice 2-fidum; *genitalia* in medio fovens.

(pone *Ophrydem.*)

spicata. 1. M. scapo qvadrangulari, floribus spicatis.
Jamaica. ♃.

umbelliflora. 2. M. scapo quinqvangulari, floribus umbellatis.
Jamaica. ♃.

SERAPIAS.

polystachia. 4–5. S. bulbis fibrosis, caule subdiviso geniculato, foliis oblongo-lanceolatis, racemo composito terminali; nectarii labio ovato recurvato.
Jamaica, Hispaniola. ♃.

flava. 4–5. S. bulbis fibrosis, caule subdiviso geniculato, foliis oblongo-lanceolatis, racemis compositis axillaribus, labio nectarii erecto acuminato.
Jamaica. ♃.

LIMODORUM.

utriculatum. 3. S. radice tuberosa, foliis radicalibus geminis vaginatis, vagina radicali inflata; scapo vaginato, floribus sessilibus.
Jamaica, Domingo. ♃.

gentianoides. 4. L. ? radice tuberosa; aphyllum, caule vaginato, floribus pedunculatis.
Jamaica. ♃.

CRANICHIS. (VII).

Nectarium galeatum.

(poſt *Arethuſam.*)

aphylla. 1. C. bulbis faſciculatis teretibus acutis; ſcapo ſubnudo, petalis conniventibus.
Jamaica. ♃.

oligantha. 2. C. bulbis faſciculatis clauatis, foliis petiolatis oblongis acuminatis nitidis; ſcapo ſubnudo, ſpica filiformi, petalis conniventibus.
Jamaica. ♃.

diphylla. 3. C. bulbis faſciculatis filiformibus nudis, foliis petiolatis cordatis acuminatis geminis; ſcapo ſubnudo.
Jamaica. ♃.

ſtachyodes. 4. C. bulbis faſciculatis teretibus obtuſis, foliis petiolatis ovatis acuminatis; ſcapo vaginato, ſpica tereti, petalis revolutis.
Jamaica. ♃.

muſcoſa. 5. C. bulbis filiformibus faſciculatis tomentoſis, foliis radicalibus petiolatis ovatis, caulinis vaginatis; nectario intus punctato.
Jamaica. ♃.

EPIDENDRUM.

* *Scandentia.*

clavicula-tum. 1–2. E. caule ſcandente tereti ramoſo, foliis ſeſſilibus ſemiamplexicaulibus acutis concavis recurvis rigidis. Cerei affinis, ſcandens planta aphylla. *Sloan.* h. 1. t. 224. 3–4. *Jamaica, Hiſpaniola.* ♃.

** *Caule folioſo erecto.*

ramoſum. E. caule ramoſiſſimo ſuffruteſcente, foliis linearibus emarginatis, racemis terminalibus compreſſis.
E. ramoſum. *Jacq. am.* 221. t. 132.
Jamaica.

nutans

nutans. E. caule simplici, foliis ovato-lanceolatis enerviis amplexicaulibus, spica terminali nutante; labio nectarii trilobo, intermedio tridentato.
Jamaica.

umbellatum. E. caule simplici, foliis ovatis emarginatis amplexicaulibus aveniis; floribus terminalibus umbellatis. E. difforme? *Jacq. am.* t. 136.
Jamaica.

anceps. E. foliis cordato-lanceolatis amplexicaulibus horizontalibus, racemo terminali compresso ancipiti subflexuoso, floribus distichis, petalis interioribus capillaribus, labio trilobo.
Jamaica.

rigidum. E. foliis oblongis obtusis vaginantibus, racemo terminali compresso ancipiti, floribus distichis spathis majoribus; labio integro cordato-ovato acuto. E. rigidum. *Jacq. am.* 222. t. 134.
Jamaica.

diffusum. E. foliis oblongis amplexicaulibus, caule ancipiti, panicula terminali ramosissima diffusa; labio integro acuminato.
Jamaica.

montanum. E. foliis lanceolatis planis recurvis patentibus submembranaceis, racemo terminali simplici, floribus secundis; labio trifido.
Jamaica. ♃.

serrulatum. E. caulibus aggregatis subdiphyllis, foliis lanceolatis carinatis serrulatis, racemo terminali, floribus distichis.
Jamaica.. ♃.

teretifolium. E. foliis semiteretibus, caule unifloro, labio apice triquetro.
Jamaica.

globosum. E. foliis teretibus canaliculatis, floribus terminalibus subsolitariis, labio ovato acuto; capsulis globosis. E. globosum. *Jacq. am.* 221. t. 133. f. 1.
Jamaica. ♃.

*** *Caule repente.*

fertularioides. E. caule filiformi repente articulato, foliis lanceolatis, pedunculis unifloris e vaginis radicalibus.
Jamaica. ♃.

rosæfolium. E. caule repente, foliis incumbentibus ellipticis convexo-concavis carinatis, floribus sub foliis sessilibus.
Jamaica. ♃.

**** *Acaulia, foliis radicalibus.*

undulatum. E. foliis ellipticis acutis, scapo sarmentoso ramosissimo, petalis ovatis ungviculatis obtusis, labio dilatato emarginato undulato. Satyrium. 15. *Brown. j.* 326.
E. chartaginense? *Jacq. am.* 228. t. 133. 4. Viscum radice majus & elatius delphinii flore ferrugineo et guttato. *Sloan.* h. 1. 250. t. 148. f. 1. Helleborine maculosa, foliis aloës carinatis. *Plum. ic.* 178. f. 2.
Jamaica.

variegatum. E. foliis lanceolatis carinatis canaliculatis, margine cartilagineo-serratis, vaginis imbricatis, scapis vaginalibus racemo simplici; labio cruciato bilobo. E. tetrapetalum? *Jacq. am.* t. 132.
Helleborine foliis carnosis carinatis—? *Plum. ic.* 177. t. 182. 2.
Hispaniola. ♃.

Utricularioides. E. foliis lanceolatis lineatis planis, scapo paniculato, labio magno cordato, cornu brevissimo.
Jamaica, Hispaniola. ♃.

triquetrum. E. foliis triquetris cultratis apice compressis lanceolatis acutis, scapo simplici; labio cordato ovato, lateribus emarginatis.
Jamaica. ♃.

sessile. E. foliis basi compressis superne latioribus, lanceolato-linearibus obtusis aveniis, pedunculis radicalibus brevissimis unifloris.
Jamaica. ♃.

flabel-

flabelliforme. E. foliis basi compressis superne dilatatis, ovato-lanceolatis acutis planis nervosis, pedunculis unifloris elongatis.
Jamaica, ♃.

subulatum. E. foliis subulatis sulcatis, pedunculis vaginatis radicalibus multifloris.
Jamaica. ♃.

Satyrioides. E. foliis subulato-teretibus, scapo paucifloro, corollis antice basi ventricosis.
Hispaniola. ♃.

tribuloides. E. foliis pedicellatis lanceolatis obtusis emarginatis, pedunculis brevissimis, capsulis globosis echinatis.
Jamaica. ♃.

corniculatum. E. foliis pedicellatis cuneatis oblongis, pedunculis radicalibus unifloris, corollis acuminatis curvis.
Jamaica. ♃.

lanceola. E. foliis pedicellatis lanceolatis acutis, pedunculis ex vaginis radicalibus bifloris.
Jamaica. ♃.

***** *Foliis bulbis innatis.*

angustifolium. E. folio lineari bulbo innato, scapo paniculato.
Jamaica. ♃.

palmifolium. E. foliis lato-lanceolatis nervosis membranaceis bulbo innatis, pedunculis radicalibus vaginatis multifloris, nectario cymbiformi integro reflexo.
Jamaica. ♃.

altissimum. E. foliis lanceolatis bulbis innatis, scapo ramosissimo sarmentoso, petalis oblongo-lanceolatis acutis, labio obcordato, petalis breviore. * E. altissimum *Jacq. am.* 229. t. 141.
Jamaica. ♃.

fragrans. E. folio lato-lanceolato enervi bulbo innato, scapo multifloro abbreviato, labio cordato.
Jamaica. ♃.

san-

sanguineum. E. foliis geminis oblongis, bulbo innatis, scapo multifloro subflexuoso, labio subrotundo undulato emarginato, cornu adnato. Satyrium 3. *Brown. jam.* 325. piscum radice bulbosa major. — *Sloan.* h. 1. p. 250. t. 121. f. 2.
Jamaica. ♃.

fabinatum. E. foliis radicalibus oblongis, bulbo medio solitari monophyllo, scapis pauciflor s, labio oblongo corpusculo carnoso superne adnato.
Hispaniola. ♃.

polybulbon. E. caule repente bulbifero, bulbis diphyllis unifloris, flore pedunculato, labio cordato.
Jamaica. ♃.

proliferum. E. caulescens, foliis distichis subimbricatis ovatis; bulbis e vaginis foliorum diphyllis, floribus axillaribus sessilibus.
Jamaica. ♃.

vestitum. E. caule aphyllo, vaginis undique imbricato teretiusculo bulbifero, bulbis folio innato; floribus confertis e vaginis caulinis.
Jamaica. ♃.

vomiforme. E. caulescens, foliis bulbis innatis ovato-acuminatis convexis canaliculatis, subtus triquetris; scapis e sinu foliorum.
Jamaica.

* * * * * * *Caules repentes, foliis imbricatis.*

echinocarpon. E. caule compresso decumbente unifloro, foliis undique imbricatis distichis ovatis; capsulis muricatis. Limodorum pendulum. *Aubl. guian.*
Jamaica. ♃.

trichocarpon. E. caule compresso tereti radicante, foliis undique imbricatis distichis linearibus; capsulis tomentosis.
Jamaica. ♃.

glaucum. E. caule compresso erectiusculo multifloro, foliis undique imbricatis distichis lato-lanceolatis glaberrimis subtus glaucis; capsulis nudis.
Jamaica. ♃. *gra.*

graminoides. E. caule erecto compresso multifloro, foliis undique imbricatis distichis remotis linearibus; pedunculis longioribus.
Jamaica. ♃.

******* *Caules unifoliati.*

micranthum. E. caule unifolio, folio lato-lanceolato, racemo longissimo filiformi, floribus secundis subrotundis hexagonis.
Jamaica. ♃.

trigoniflorum. E. caule unifolio, folio oblongo lanceolato, racemo longitudine foliorum, floribus subsecundis trigonis. E. ophioglossoides. *Jacq. am.* t. 133. f. 3.
Jamaica. ♃.

racemiflorum. E. caule unifolio, folio ovato, racemo foliis longiore, floribus secundis, petalis interioribus ovatis.
Jamaica. ♃.

alpestre. E. caule unifolio, folio ovato-lanceolato, racemis laxis, capsularum carinis muricatis.
Hispaniola. ♃.

laxum. E. caule unifolio, folio oblongo, racemo longitudine foliorum, interioribus petalis subulatis, labio ovato, capsulis nudis.
Jamaica. ♃.

ovale. E. caule unifolio, folio ovato acuminato, racemo adpresso multifloro, petalis subrotundis, interioribus antice basi remotis, capsulis pedicellatis.
Jamaica. ♃.

pulchellum. E. caule unifolio, folio subrotundo-acuto, racemo laxo paucifloro, petalis acuminatis ciliatis, interioribus apice cruciantibus.
Jamaica. ♃.

tridentatum. E. caule unifolio, folio ovato-acuto apice tridentato, racemo multifloro, floribus triquetris acuminatis, petalis nectarii erectis incurvis.
Jamaica. ♃.

cochle-

cochlearifolium. E. caule unifolio, folio orbiculato convexo concavo, racemo paucifloro.
Jamaica.

* * * * * * * * *Aphylla.*

funale. E. aphyllum, filiforme radicans: pedunculo 2-floro, labio 2-lobo, cornu longisſimo ſubulato.
Jamaica. ɣ.

filiforme. E. aphyllum, filiforme, radicans; pedunculis ſub 3-floris, labio ovato, cornu breviſſimo, apice capitato.
Hiſpaniola. ɣ.

HEXANDRIA.

ARISTOLOCHIA.

obtuſata. 9–10. A. foliis cordatis apice rotundatis 3-nerviis, ſubtus reticulato-venoſis tomentoſis; caule volubili, pedunculis ſolitariis. *
Ariſtolochia. fol. cordatis obtuſis. *Plum. ic.* 27. t. 33.
Inſulæ Caribeæ. ɣ.

grandiflora. 9–10. A. foliis lato-cordatis, caule volubili ſubherbaceo, pedunculis ſolitariis: labio corollæ maximo, cauda longisſima.
Brown. jam. 329. n. 4.
Jamaica. ɣ.

CLAS-

CLASSIS XXI.

CRYPTOGAMIA.

PLANTÆ.

FICUS.

americana. 10–11. F. foliis ovatis oblongis venosis integerrimis baccis axillaribus pedunculatis confertis.
Ficus americana *Aubl.*
Ficus alia, foliis lauri fructu minore. *Plum. sp.* 124. t. 132. f. 2.
Ficus indica folio oblongo fructu minore pallide luteo sphærico, *Sloan.* h. 2. p. 140.
Jamaica. ♄.

FILICES.

OSMUNDA.

peltata. 11–12. O. surculo repente, fructificationibus pedatis distinctis subrotundo-dimidiatis integris; frondibus dichotomis laciniis linearibus.
Lichen digitatus Geranii facie. *Plum. fil.* T. 50. f. 4.
Jamaica.

aurita. 11–12. O. scapis radicatis; frondibus inferne bipinnatis superne pinnatis, pinnis basi sursum auritis serratis convexis nitidis.
Jamaica.

lineata. 17–18. O. frondibus pinnatis lanceolatis, basi oblique cordatis margine integris; fructificantibus (pinnis) crenulatis medio squamosis.
Jamaica.

polypodioides. 17–18. O. frondibus lanceolatis pinnatifidis, laciniis confluentibus integris adscendentibus, punctis ad marginem elevatis, scapo lanceolato, pinnis remotis.
Jamaica.

MARA-

MARATTIA.

Capſulæ multiloculares: *Loculis* ſuperne dehiſcentibus.

(pone *Oſmundam.*)

alata. 1. MARATTIA.

ACROSTICHUM.

ſimplex. 1–2. A. frondibus integris glabris petiolatis, ſterilibus lanceolatis acuminatis, fertilibus lineari-lanceolatis.
Jamaica.

petiolatum. 1–2. A. frondibus integris glabris petiolatis, ſterilibus lineari-lanceolatis, fertilibus linearibus.
Jamaica.

latifolium. 1–2. A. frondibus petiolatis lato-lanceolatis glaberrimis integris marginatis; fructiferis ovato-lanceolatis, ſurculo repente. Acroſticum 1. *Brown. jam.* 104. Lingva cervina rigida & glabra. *Plum. fil.* 135.
Jamaica.

villoſum. 4–5. A. frondibus lato-lanceolatis ſubcrenulatis utrinque villoſis. Lingva cervina villoſa minor. *Plum. fil.* 127. f. D.
Jamaica.

muſcoſum. 4–5. A. frondibus petiolatis integris ſqvamoſis; ſterilibus oblongo-lanceolatis obtuſis, fertilibus lineari-lanceolatis.
Lingva cervina villis & ſqvamulis aureis muſcoſa. *Plum. fil.* 139.
Jamaica.

ſerrulatum. 5–6. A. frondibus linearibus dentatis, apice fructificantibus, ſurculo breviſſimo radicante.
Jamaica.

graminoides. 6–7. A. frondibus nudis linearibus apice ſubdichotomis fructificantibus.
Jamaica.

ſul-

fulphureum. 27–28. A. frondibus bipinnatis; pinnis alternis ovatis pinnatifidis, foliolis retufis ferratis. Filix aurea pinnulis rotundis incifis, diviſa. *Plum. fil.* 44. *Jamaica.*

PTERIS.

anguſtifolia. 2–3. P. frondibus ſimplicibus lanceolato-linearibus integris erectis margine toto fructificanibus. *India occidentalis.*

denticulata. 10–11. P. frondibus pinnatis, pinnis inferioribus ſemipinnatis lanceolatis, ſterilibus denticulato-ciliatis, fertilibus integerrimis. *Hiſpaniola.*

aculeata. 16–17. P. fronde ſupradecompoſita, foliis 2-pinnatifidis, pinnis lato-lanceolatis, caudice arboreo aculeato. Filix ramoſa arboreſcens et aculeata. *Plum. fil.* t. 5. *Jamaica.*

HEMIONITIS.

lineata. 1–2. H. fronde lanceolato-lineari, lineis fructificantibus ſubparalleiis longitudinalibus. *Jamaica.*

ASPLENIUM.

proliferum. 1–2. A. frondibus ſubſeſſilibus lato-lanceolatis primoribus obovatis, apice radicantibus. Phyllitis non ſinuata apice folii radices agente. *Sloan.* h. I. 71. t. 26. f. 1. *Jamaica.*

pumilum. 7–8. A. fronde ternata, foliolis 3-partito-inciſis. Hemonitis pumila 5-phylla? *Plum. fil.* 66. A. *Jamaica.*

dimidiatum. 11–12. A. frondibus pinnatis, pinnis trapezo-oblongis acuminatis ſurſum angulatis deorſum integris planis. *Jamaica.*

fragrans. 20–21. A. frondibus sub–3–pinnatis, foliolis alternis, pinnis lanceolatis latiusculis, apice serratis. *Jamaica.*

grandifolium. 22–23. A. frondibus pinnatis; pinnis alternis lanceolatis subserratis, basi superne rectangulosis, inferne rotundatis. *Jamaica.*

dissectum. 22–23. A. frondibus pinnatis, pinnis lanceolatis inciso-serratis apice caudatis. Lonchitis dentata pinnularum cacumine disfecto. *Plum. fil.* 46. *Jamaica.*

præmorsum. 22–23. A. fronde 3–pinnatifida, pinnis subcuneiformibus, pinnulis apice eroso-dentatis. *Jamaica.*

cicutarium. 22–24. A. fronde 3–pinnata glaberrima, superioribus pinnatifidis, foliolis lanceolatis integris. Rutæ murariæ accedens, filicula non rimosa minima. *Sloan.* h. 1. 92. t. 52. f. 3. mala.

POLYPODIUM.

* *Fronde indivisa.*

angustifolium. 1–2. P. frondibus lineari-lanceolatis longissimis acuminatis rigidis, margine convexo, fructificationibus sparsis, furculo repente. *Jamaica.*

gramineum. 1–2. P. frondibus acuminatis integerrimis glabris, fructificationibus solitarii, furculo nudo. *Jamaica.*

marginellum. 1–2. P. frondibus cuneiformibus linearibus obtusis marginatis glabris, fructificationibus solitariis confertis, furculo brevissimo nudo. *Jamaica.*

repens. 1–2. P. frondibus lanceolatis acuminatis glabris integris, fructificationibus sparsis; furculo repente. Lingva Cervina radice repente. *Plum. fil.* t. 134. *Jamaica.*

ser-

ſerpens. 2–3. P. frondibus lanceolato-linearibus glabris ſubundulatis, fructificationibus ſolitariis; ſtirculo hirſuto radicante.
Lingva cervina ſcandens anguſtis & undoſis foliis. *Plum. fil.* t. 124.
Hiſpaniola.

** *Fronde pinnatifida.*

pendulum. 11–12. P. frondibus pinnatifidis ſubſeſſilibus glabris pendulis, lobis oblongis obtuſiuſculis.
Jamaica.

inciſum. 13–14. P. frondibus lanceolatis pinnatifidis, lobis rotundatis, infimis minoribus coadunatis.
Polypodium inciſuris aſplenii. *Plum. fil.* t. 91.
Polypodium ſcolopendrioides. *Linn. Sp. pl. ed.* 1.
Jamaica.

trichomanoides. 13–14. P. frondibus pinnatifidis ſubpiloſis, lobis ſemiovatis obtuſis.
Jamaica.

myoſuroides. 13–14. P. frondibus pinnatifidis glabris, lobis in apicem lanceolatum coadunatis fructiferis, inferioribus remotis.
Jamaica.

incanum. 19–20. P. frondibus pinnatifidis, pinnis lanceolatis obtuſis diſtantibus patentibus integris, ſubtus ſtipiteque incano-ſquamoſis.
Acroſtichum polypodioides. *Linn. Sp. pl.* Acroſtichum 2. *Brown. jam.* 105.

*** *Fronde pinnata.*

muricatum. 27–28. P. frondibus pinnatis, pinnis falcato-lanceolatis ſubſerratis ſurſum auritis, baſi & antice ſpinoſis, ſtipite ſquamoſo.
Trichomanes majus totum album pinnis aculeatis trapezii figura. *Sloan.* h. 82. t. 36. f. 4–5.
Jamaica.

ſemicordatum. 28–29. P. fronde pinnata, pinnis paralellis lanceolatis glaberrimis, baſi oblique cordatis, lobo inferiore gibboſiore, fructificationibus 4-ſeriatis. Lingva Cervina ſol. enſiformibus ſerratis. *Plum. fil.* t. 113.
Jamaica.

ſagittatum. 28–29. P. fronde pinnata, pinnis lanceolatis obtuſis integris, baſi utrinque denticulo auctis inferioribus mutilatis 3-angularibus minutis.
Jamaicâ.

repens. 32–33. P. frondibus pinnatis repentibus, apice radicantibus, pinnis ſubcordatis ovatis obtuſis crenatis, baſi ſubauriculatis. Lonchitis aſplenii facie. *Sloan.* h. t. 30. f. 1. Adianthum. *Pluk. alm.* t. 253. f. 4.
Jamaica.

rhizophyllum. 32–33. P. frondibus pinnatis decumbentibus, apice caudatis fructiferis radicantibus, pinnis ovato-deltoideis.
Jamaica.

obliteratum. 35–36. P. fronde pinnata, pinnis alternis lato-lanceolatis attenuatis crenatis, crenis apice & baſi utrinque obliteratis.
Jamaica.

crenatum. 35-36. P. fronde pinnata, pinnis oblongo-lanceolatis crenatis glabris, fructificationibus dupliciter ſerialibus. Lingva Cervina rotundius crenata. *Plum. fil. t.* III. *am.* 10.
Jamaica.

**** *Fronde bipinnatifida.*

ſerra. 38–39. P. fronde bipinnatifida, pinnis linearibus longiſſimis attenuatis ſerratis, ſerraturis ſemiovatis acutis ſtriatis.
Filix non ramoſa major, ſurculis — *Sloan.* h. 1. 90. t. 48.?
Jamaica.

4-gonum. 38–39. P. frondibus 2-pinnatifidis; pinnis lanceolatis acuminatis oppoſitis diſtantibus horizontalibus, lacniis ovatis obtuſiuſculis, ſtipite tetragono.
Jamaica.

ſanctum

ſanctum. 38–39. P. frondibus ſubbipinnatis, pinnis ſuperioribus coadunatis, inferioribus linearibus obtuſis integris, infimis majuſculis acutis crenatis. Acroſtichum ſanctum *Linn.* Acroſtichum. *Brown. jam.* 105.
Filix jamaicenſis—*Pluk. alm.* 150. t. 283. *Sloan.* h. t. 49. 2.
Jamaica.

deltoideum. 39–40. P. fronde 2-pinnatifida, pinnis inferioribus abbreviatis integris oblongis deltoidibus reflexis.
Jamaica.

inviſum. 45–46. P. fronde 2-pinnatifida glabra; pinnis lineari-lanceolatis attenuatis longiſſimis, pinnulis ovato-falcatis acutis integris, infimis æqualibus. Filix non ramoſa major, ſurculis crebris pinnulis longis anguſtis. *Sloan.* h. 1. 90. t. 51.
Jamaica, Hiſpaniola.

parens. 45–46. P. fronde 2-pinnatifida, ſubtus villoſiuſcula; pinnis lineari-lanceolatis elongatis; pinnulis oblongis acutis integris, infimis longioribus. Filix non ramoſa minor. *Sloan.* h. 1. 91. t. 52. f. 1.
Jamaica.

hirtum. 53–54. P. fronde inferne 3-pinnatifida, ſuperne 2-pinnatifida & tandem pinnatifida, laciniis ovatis obtuſis ſubintegris, ſtipite ramisque hirtis.
Jamaica.

dichotomum. 61–62. P. dichotomum, frondibus pinnatis, pinnis lineari-lanceolatis integerrimis horizontalibus, ſubtus glaucis. Acroſtichum furcatum. *Linn.*
Polypodium dichotomum. *Thunb. Japon.* 338. t. 37. *Plum. fil.* 1. 28.

coriaceum. 66–67. P. fronde coriacea, inferne 3-pinnatifida, ſuperne 2-pinnata, pinnis pinnulisque acuminatis.
Jamaica.

denticu-latum, 77-78. P, fronde inferne 4-pinnata, superne 3-pinnata glabra; pinnulis cuneato-ovatis incisis denticulatis fructificationibus solitariis.
Jamaica.

armatum, 59-60. P. frondibus 4-pinnatis, pinnulis lanceolatis crenulatis supra glabris, inferne hirsutis, fructificationibus confertis; ramis ramulisque asperis, caudice arboreo aculeato.
Jamaica.

glaucum, 64-65. P. frondibus 4-pinnatis, ramis ramulisque lanceolatis; pinnis lanceolatis pinnatifidis, laciniis ovatis acutis, subtus glaucis.
Jamaica.

dissectum, 77-78. P, fronde 4-pinnatifida glabriuscula, pinnulis ovatis obtusis inciso-serratis, fructificationibus in sino solitariis, ramis ramulisque pubescentibus. Lonchitis altissima globuligera minor. *Plum. fil.* t. 31.
Adianthum nigrum ramosum max. *Sloan.* h. 1. 96. t. 37. f. 1. 2.
Jamaica.

effusum, 77-78. P, fronde 5-pinnatifida subglabra membranacea, pinnulis acutis argute serratis, rachibus ramulorum marginatis.
Adianthum ramosum max. — *Sloan.* h. 1. t. 57. f. 3.
Jamaica.

ADIANTUM.

* *Fronde composita.*

pumilum, 7-8. A, fronde pinnata, stipite capillari, pinnis alternis subrotundis serrulatis, summa majuscula trapezoidea, fructificationibus interruptis. Adianthum. 1. *Brown. jam.* 87. Filix parva: *Pluk. alm.* t. 251. 4.
Jamaica.

deltoideum, 6-7. A. fronde pinnata, pinnis alternis deltoidibus obtusis, summa triangulari, fructificationibus superne & antice continuatis.
Jamaica.

macro-

macrophyllum. 6–7. A. fronde pinnata, pinnis oppositis rhomboideis acutis, ima majori, infimis subhastatis reflexis, fructificationibus antice & inferne continuatis. Adianthum 2. *Brown. jam.* 87. f. 38. f. 1. Trichomanes majus nigrum — *Sloan.* t. 81. 34.
Jamaica.

serrulatum. 15–16. A. fronde 2–pinnata, pinnulis deltoideo-oblongis serratis, fructificationibus solitariis superioribus. A. serrulatum *Linn. Plak. alm.* t. 253. f. 1.
Jamaica.

striatum. 16–17. A. fronde 2–pinnata, pinnulis rigidis falcato-ovatis striatis, fructificationibus superioribus interruptis, stipite tereti aspero.
Jamaica.

strictum. 16–17. A. fronde 2–pinnata, pinnis tetragonis fastigiatis erectis, pinnulis alternis lunatis integris, fructificationibus superioribus continuatis.
Jamaica.

microphyllum. 15–17. A. fronde 2–pinnata: foliolis alternis oblongis obtusis crenatis infimis pinnatifidis: Adianthum nigrum ramosum, ramulis — *Sloan.* h. 1. 98. t. 13. f. 2.
Jamaica.

denticulatum. 21. A. frondibus decompositis: pinnis alternis trapezoideis acuminatis cretatis, crenis denticulatis, fructificationibus superioribus interruptis. Lonchitis serrata & retusa. *Plum. fil.* t. 52. Adianthum Jamaicense. *Pluk. phyt.* t. 252. 5.
Jamaica.

fragile. 21–22. A. fronde subsupradecomposita superne 2-pinnata; pinnis obovatis cuneatis integris, fructific. interruptis.
Jamaica.

tenerum. 21–22. A. fronde supradecomposita: pinnulis alternis rhombeo-cuneiformibus obtusatis incisis, fructificationibus interruptis. Adianthum. 7. *Brown. jam.* 88. Adianthum ramosius, pediculis lucidis. *Pluk. phyt.* t. 254. f. 1. *Jamaica, Hispaniola.*

TRICHOMANES.

pusillum. 1–2. T. fronde simplici lineari incisa, surculo repente.
Jamaica.

reptans. 2–3. T. frondibus cuneato-ovatis inciso-pinnatifidis, surculo repente.
Jamaica.

asplenioides. 2–3. T. frondibus pendulis lanceolatis pinnatifidis glabriusculis, laciniis bilobis, lobis obtusis, fructificationibus bivalvibus.
Jamaica.

crinitum. 3–4. T. frondibus subpinnatis pilosis, pinnis ovatis pinnatifidis, laciniis bifidis, lacinulis obtusis, fructificationibus setigeris stipite erecto hirto.
Jamaica.

lucens. 3–4. T. frondibus 2–pinnatifidis pendulis lanceolatis hirtutis lucidis, pinnis paralellis, laciniis subrotundis subserrulatis, stipite hirsutissimo.
Jamaica.

sericeum. 4–5. T. frondibus 2–pinnatifidis pendulis lanceolatis tomentosis, pinnis alternis, laciniis linearibus obtusis integris, inferioribus 2-fidis, fructificationibus terminalibus hirsutis. Trichomanes pendulum sericii instar molle, *Plum. fil.* t. 73.
Jamaica.

fucoides. 7–8. T. frondibus 2–pinnatifidis ovatis glabris, pinnis ovatis, laciniis bipartitis, lacinulis serratis obtusis, fructificationibus 2–valvibus, supra basin pinnarum insertis.
Jamaica.

ciliatum. 7–8. T. frondibus erectis 2–pinnatifidis deltoideis; pinnis ovatis, laciniis linearibus obtusis ciliatis, fructificationibus terminalibus bivalvibus hirtis, stipite marginato.
Jamaica.

lineare.

lineare. 7–8. T. frondibus ſubbipinnatis pendulis lanceolatis glabris, foliolis remotis, pinnulis linearibus 2–partitis, fructificationibus terminalibus 2–valvibus, ſtipite capillari.
Jamaica.

undulatum. 8–9. T. frondibus 2–pinnatifidis 2–pinnatisve pendulis lanceolatis, foliolis pinnisque alternis decurrentibus; laciniis linearibus retuſis crenulato - undulatis, fructificationibus terminalibus 2–valvibus.
Jamaica.

rigidum. 10–11. T. frondibus 4–pinnatifidis erectis deltoidibus, foliolis parentibus, pinnis lanceolatis, laciniis linearibus apice inciſis, ichyphis fructiferis pedicellatis axillaribus.
Jamaica.

polyanthos. 10–11. T. frondibus 4–pinnatifidis deltoideis erectis, pinnis pinnulisque decurrentibus laciniis linearibus obtuſis, fructificationibus bivalvibus numeroſis, ſtipite marginato.
Jamaica.

clavatum. 10–11. T. frondibus 4–pinnatifidis oblongo - lanceolatis laxis, pinnis pinnulisque decurrentibus, laciniis linearibus emarginatis, fructificationibus terminalibus 2–valvibus ſubrotundis, ſtipite teretiuſculo.
Jamaica.

aculeatum. 13. T. fronde ſupradecompoſita ſcandente ramoſiſſima, foliolis palmatis, laciniis linearibus obtuſis, ſtipite aculeato.
Acroſtichum aculeatum *Linn.*

MUSCI.

LYCOPODIUM.

ſquarroſum. 3-4. L. foliis ſubverticillatis undique reflexis, inferioribus ſquarroſis rigidis, caule dichotomo faſtigiato, capſulis ſparſis.
Selago Conidis folio *Dill. muſc.* 440. t. 57. f. 4.
Muſcus ſquamoſus maximus erectus ſabinæ folio — *Plum. fil.* 144. t. 166. f. A.
Jamaica, Guadeloupe.

taxifolium. 8–9. L. foliis ſparſis lanceolato-linearibus patulis; caule erecto dichotomo, fructificationibus ſparſis.
Jamaica.

dichotomum. 8–9. L. foliis ſparſis lineari-acuminatis patulis; caule declinato aſcurgente dichotomo, ramis patulis, fructificationibus ſparſis.
Brown. jam. 84. 1.
Lycopodium dichotomum. *Jacq. Vindeb.* III. 26. t. 45.
Jamaica, Hiſpaniola, Martinica.

ſtoloniferum. 23–24. L. foliis bifariis patentibus, ſuperficialibus oblongis acutis diſtichis, furculis tetragonis repentibus longiſſimis, inferne ſubnudis ſtoloniferis; ſpicis terminalibus ſeſſilibus. Muſcus ſqvamoſus repens — *Plum. fil.* t. 43.
Hiſpaniola.

FONTINALIS.

criſpa. F. furculis ramoſis pennatis, foliis duplicato-bifariis rotundatis patentibus imbricatis undulatis, capſulis lateralibus poſticis.
Sphagnum pennatum undulatum, vagina ſqvamoſa. *Dill. muſc.* 209. t. XXXII. f. 8.
Jamaica.

diſticha. F. furculis ſimplicibus, foliis bifariis patentibus retuſis imbricatis planis, capſulis lateralibus poſticis.
Jamaica, Hiſpaniola.

filicina. F. furculis erectis pinnatis, pinnis approximatis, foliis 5-fariis ovatis acutis; capſulis axillaribus.
Jamaica.

hypnoidea. F. furculis repentibus, ramis erectis ſubdiviſis ſparſis, foliis lanceolatis bicarinatis adpreſſis, capſulis axillaribus.
Jamaica.

filiformis. F. furculis pendulis filiformibus ſimpliciuſculis divaricatis, foliis ovatis acutis denſis patulis, capſulis axillaribus ſparſis.
Hiſpaniola.

POLY-

POLYTRICHUM.

convolutum. P. caule ſimplici, foliis involutis ſubulatis. *Meth. Muſc.* 33. t. I. f. 3.
Jamaica.

MNIUM.

tomentoſum. 2–3. M. ſurculo dichotomo erecto tomentoſo, foliis ſubulatis, capſulis ſphæricis.
Jamaica.

ſphæricarpon. 2–3. M. ſurculis erectis tomentoſis filiformibus, ramis ſimplicibus faſciculatisque terminalibus, foliis capillaceis, capſulis ſphæricis.
Jamaica.

ſtrictum. 7–8. M. ſurculis cauleſcentibus, foliis capillaceis; pedunculis elongatis terminalibus, capſulis obliquis.
Jamaica.

BRYUM.

agrarium. 6–7. B. acaule, capſulis cylindricis erectiuſculis ſubulatis, foliis lanceolatis acutis.
Jamaica.

acuminatum. 6–7. B. capſulis cylindricis erectis ſubulatis, ſurculis cauleſcentibus cæſpitoſis, foliis linearibus.
Jamaica.

Lycopodioides. 9–10. B. capſulis erectis, pedunculis abbreviatis ſolitariis, ſurculis elongatis ſubramoſis, foliis patentibus linearibus acutis ſerrulatis ſubundulatis.
Jamaica.

paraſiticum. 12–13. B. capſulis erectiuſculis, pedunculis breviſſimis, ſurculis confertis ramoſis brevibus, foliis patentibus linearibus.
Hiſpaniola.

calycinum. 13–14. B. capſulis erectiuſculis, perichætiis longiſſimis longitudine pedunculorum; ſurculis erectis, foliis linearibus cirrhoſis.
Jamaica.

HYP-

HYPNUM.

palmatum. 4–5. H. fronde ſimplicisſima pinnata ſubpalmata, apice pedunculifera, pinnis diſtantibus patentibus.
Jamaica.

polypodioides. 4–5. H. fronde ſimplicisſima pinnata lanceolata erecta, verſus apicem pedunculifera, pinnis obtuſis, pedunculis capſulisque incurvis.
Jamaica.

aſplenioides. 6–7. H. fronde ſubramoſa pinnata erecta lineari, apice pedunculifera, capſulis incurvis.
Jamaica.

fulgens. 10–11. H. ſurculis vagis longisſimis pendulis; frondibus compreſſis foliolis diſtichis complicato-carinatis nitidis.
Jamaica.

diaphanum. 10–11. H. ſurculis vagis erectiuſculis ſubdiviſis, foliolis bifariis ovatis acuminatis pellucidis planis.
Jamaica.

albicans. 12–13. H. ſurculis repentibus ramoſis compreſſis, ramis vagis, foliolis bifariis ovatis acutis pallidis, capſulis ſubnutantibus.
Jamaica.

glabellum. 13–14. H. ſurculis divaricatis erectiuſculis ramoſis, foliolis bifariis imbricatis oblongis obtuſis planis ſubdenticulatis.
Jamaica.

patulum. 29–30. H. ſurculis filiformibus repentibus, ramulis vagis breviſsimis, foliolis lanceolatis reflexo-patulis.
Jamaica.

reptans. 31–32. H. ſurculis reptantibus, ramis vagis faſciculatisve radicantibus filiformibus, foliolis capillaribus patulis, capſulis nutantibus.
Jamaica.

faſciculatum. 32–33. H. ſurculo erecto, ramis terminalibus confertis ſubdiviſis, ramulis compreſſis, foliolis oblongis decuſſatis ſparſis.
Jamaica.

tamariſci. 32–33. H. ſurculo erecto, ramis faſciculatis terminalibus ſubdiviſis, foliis bifariis, ſubtus medio auriculatis, foliolis ſubrotundis acutis carinatis.
Jamaica.

flexile. 34–35. H. ſurculis repentibus pendulisque longiſſimis flexuoſis, ramulis vagis abbreviatis teretibus recurvis, foliolis confertis ovatis patulis.
Jamaica.

nigreſcens. 34–35. H. ſurculis filiformibus pendulis, ramis brevibus teretibus ſparſis, foliis æqvalibus ſubulatis patulis.
Jamaica.

denſum. 34–35. H. ſurculis erectis teretibus, ramis vagis ſimpliciuſculis, foliolis approximatis lanceolatis acutis carinatis patulis.
Jamaica.

compoſitum. 35–36. H. ſurculis ramisque pinnato-ſparſis, ramulis confertis, pedunculis breviſſimis, capſulis erectis, calyptris piloſis.
Jamaica.

polytrichoides. 38–39. H. ſurculis teretibus erectis ſimplicibus, foliis patulis, pedunculis brevibus, capſula erecta calyptra piloſa.
Jamaica.

capillare. 40–41. H. ſurculis repentibus filiformibus ramoſis, ramis confertis capillaribus, foliolis adpreſſis ſubulatis, capſulis ovatis erectis.
Jamaica.

tomentoſum. 40–41. H. ſurculis repentibus tomentoſis, ramis vagis confertis erectiuſculis, foliolis acutis patentibus diſtantibus, capſulis cylindricis nutantibus, operculis incurvis.
Hiſpaniola.

depreſſum. 41–42. H. ſurculis confertis repentibus ramoſis, ramulis depreſſis, foliolis lineari-lanceolatis patulis ſiccitate criſpis, capſulis nutantibus.
Jamaica.

trichophyllum. 41–42. H. ſurculo repente, ramis diſtantibus erectis foliis capillaribus patentibus, capſulis erectis. Muſcus—Sloan. h. 1. t. 25. f. 1.
Jamaica, micro-

microphyl-lum. 42–43. H. furculis confertis repentibus ramosis, ramulis filiformibus teretibus erectis, foliolis incumbentibus subulatis; capsulis obliqvis.
Jamaica.

caespitosum. 43–44. H. furculis confertis simplicibus erectiusculis tereti-compressis, foliol. ovato-lanceolatis, pedunculis furculis brevioribus, capsulis erectis.
Hispaniola.

pungens. 43–44. H. furculis confertis erectis teretibus ramosis apice attenuatis acutis; foliol. lanceolatis subulatis patulis rigidiusculis, pedunculis capillaribus brevibus.
Jamaica.

congestum. 44–45. H. furculis confertis ramosis declinatis, ramis erectiusculis apice inflexis, foliolis secundis subcapillaceis; pedunculis brevibus.
Jamaica.

tetragonum. 44–45. H. furculis repentibus, ramis vagis erectiusculis tetragonis, foliol. 4-farie imbricatis concavis.
Jamaica.

torquatum. 44–45. H. furculis repentibus confertis, ramis erectis teretibus, foliol. siccitate spiraliter adpressis, calyptra coriacea basi 5-partita.
Jamaica.

cirrhosum. 44–45. H. furculis repentibus confertis, ramis subdivisis, foliolis siccitate revolutis, capsulis globosis, calyptris basi multipartitis.
Jamaica.

ALGAE.

IUNGERMANNIA.

adiantoides. 1–2. I. frondibus erectis subdivisis simpliciter pinnatis, foliolis obliquis ovatis ciliatis; fructificationibus terminalibus.
Jamaica.

crista-

criſtata. 1–2. I. ſurculis repentibus, frondibus ramoſis erectis, foliolis lanceolatis acutis patentibus incumbentibus margine ſuperiore ſerratis, ſubrus lobis conniventibus criſtatis.
Jamaica.

proſtrata. 1–2. I. frondibus filiformibus reptantibus proſtratis ſimpliciuſculis, ſimpliciter pinnatis, foliolis alternis ovatis integris.
Jamaica.

pallens. 4–5. I. frondibus erectis ramoſis, foliolis ſimpl. pinnatis incumbentibus ſubrotundis integris, baſi ſemicordatis, perichætiis monophyllis retuſis infundibuliformibus.
Jamaica.

ſimplex. 4–5. I. ſurculis filiformibus repentibus, frondibus erectis ſimplicibus, foliolis ſimpl. pinnatis ovatis diſtantibus ſerrato-ciliatis fructific. terminalibus.
Jamaica.

perfoliata. 5–6. I. frondibus confertis erectis indiviſis, ſimpl. pinnatis, foliolis perfoliatis incumbentibus ſecundis ovatis integris.
Jamaica.

connata. 7–8. I. frondibus vagis ſimpl. pinnatis, foliol. oppoſitis incumbentibus apice retuſis ſubemarginatis poſtice connatis bidentulis; fructific. terminalibus, perichætio denticulato.
Jamaica.

tenera. 10–11. I. frondibus ſimpliciter pinnatis congeſtis repentibus, foliolis alternis diſtantibus ſubrotundis integris, auriculis ſubtus medio minutiſſimis bifidis.
Jamaica.

ſerrulata. 11–12. I. ſurculis confertis erectis ſimpliciuſculis obtuſis ſupra 2-pinnatis, foliolis ſecundis ovatis concavis 2-fidis ſerratis, fructificationibus terminalibus, perichætio ſubulato.
Jamaica.

juniperoidea. 11–12. I. frondibus erectis simplicibus rigidis supra 2–pinnatis apice floriferis, foliis lanceolato-falcatis bifidis secundis.
Jamaica.

capillaris. 12–13. I. furculis repentibus ramosis capillaribus supra bipinnatis, foliolis subimbricatis omnibus tripartitis.
Jamaica.

cupressina. 12–13. I. frondibus procumbentibus confertis pennatis supra 2–pinnatis, foliolis imbricatis convexis 4–fidis.
Jamaica.

transversalis. 16–17. I. frondibus transversaliter repentibus duplicato-imbricatis, foliolis subrotundis integris.
Jamaica.

flava. 16–17. I. frondibus repentibus ramosis duplicato-imbricatis, foliolis subrotundis, inferioribus minimis 2–fidis, perichætiis monophyllis retusis.
Jamaica.

diffusa. 16–17. I. frondibus dichotomis erectis duplicato-imbricatis (furculis ramosissimis,) foliolis ovatis convexis inferioribus subrotundis dentatis.
Jamaica, Hispaniola.

stolonifera. 16–17. I. frondibus erectis confertis subdivisis duplicato-imbricatis, stolonibus reptantibus filiformibus, foliolis lanceolatis 3–dentatis secundis, inferioribus minimis subrotundis.
Jamaica.

brachiata. 16–17. I. frondibus erectis dichotomis duplicato-imbricatis, foliolis ovatis planis, inferioribus subrotundis convexis.
Jamaica.

atrata. 18–19. I. furculis ramosissimis pendulis capillaribus duplicato imbricatis; foliolis ovatis retusis, inferioribus minutis cordatis bifidis.
Jamaica.

filiformis. 18–19. I. frondibus erectis filiformibus simpliciusculis duplicato-imbricatis, foliolis subrotundis integris, inferioribus minutis.
Jamaica. *fili-*

filicina. 19–20. I. furculis erectis ramosis pennatis, pinnis linearibus duplicato-imbricatis, foliolis ovatis acutis serrulatis, inferioribus subemarginatis dentatis.
Jamaica.

tomentosa. 20–21. I. furculis erectis confertis pennatis, pinnis duplicato-imbricatis, foliolis laciniatis tomentoso-ciliatis, fructificationibus terminalibus solitariis.
Jamaica.

bifaria. 22–23. I. furculis erectis simpliciusculis confertis bifariam imbricatis, foliolis subsecundis ovatis acutis denticulatis, fructificationibus terminalibus.
Jamaica.

sinuata. 29–30. I. acaulis, fronde plana integra & pinnatifida sinuata, lobis coadunatis obtusis.
Jamaica.

fucoidea. 30–31. I. frondibus erectis supradecompositis, foliis oppositis, pinnis oppositis linearibus.
Jamaica.

2-pinnata. 31–32. I. acaulis, frondibus procumbentibus, ramosa 2-pinnata; pinnis lacinulisque linearibus acutis.
Jamaica.

dichotoma. 32–33. I. acaulis, fronde lineari dichotoma erectiuscula.
Jamaica.

linearis. 32–33. I. acaulis, fronde reptante lineari dichotoma divaricata.
Jamaica, Hispaniola.

polyphylla. 32–33. I. acaulis, frondibus congestis subrepentibus laciniatis palmatisque, fructificationibus radicalibus.
Jamaica.

MARCHANTIA.

hirsuta. 1–2. M. calyce communi hemisphærico 8-fido hirsuto.
Jamaica.

RICCIA.

reticulata. ? R. fronde difformi laciniata glabra reticulata.
Lichenoides gelatinos. tenue reticulatum. *Dill. muſc.* t. 19. f. 21.
Jamaica.

ANTHOCEROS.

criſpus. 2–3. A. frondibus ſinuatis laciniatis undulatis margine criſpis.
Jamaica.

LICHEN.

fungoides. 21–22. L. leproſus candidus, tuberculis ſtipitatis capitatis difformibus ſubcarneis, ſtipitibus longioribus.
Jamaica.

pannoſus. 24–30. L. cruſtaceus, ſubtus nigro-tomentoſus, ſuperne ſublobatus obſolete multifidus, ſcutellis convexis rufis.
Jamaica.

impreſſus. 30–31. L. cruſtaceus albicans, ſcutellis concavis atro-cæruleſcentibus albo-marginatis. *Act. Scient. Upſ.* IV.
Jamaica.

gosſypinus. 31–32. L. cruſtaceus capillaceus mollis tomentoſus candidus; ſcutellis nigris margine albidis.
Jamaica.

pictus. 34–35. L. imbricatus, foliolis multifidis ſinuatis adnatis centrifugis albidis; ſcutellis atris albo-marginatis.
Jamaica.

Cocoës. 45–46. L. imbricatus; foliolis adnatis ſinuatis candidis, ſcutellis parſis atris.
Jamaica.

damæcornis. 52–56 L. foliaceus; multipartito-dichotomus glaber, apicibus bifidis, ſubtus tomentoſus, peltis marginalibus.
Jamaica. *laci.*

laciniatus. 52-53. *L.* foliaceus, depressus rigidus, irregularis laciniatus incisus glaber subtus tomentosus. *Jamaica.*

flavicans. 57-58. L. foliaceus, lineari-teretiusculus ramosus fulvus, scutellis planis marginalibus concoloribus. Usnea. *Brown. jam.* 80. 2. *Jamaica.*

cerotophyllus. 58–59. L. foliaceus rectus laciniatus, foliolis obtusis cornigeris. *Jamaica.*

diaphanus. 59–60. L. foliaceus, membranaceo-pellucidus cærulescens tenerrimus laciniatus plicato-undulatus, laciniis crispatis; scutellis sparsis ferrugineis *Jamaica.*

marginellus. 59–60. L. foliaceus, membranaceo-pellucidus lobatus plicato-undulatus, scutellis marginalibus minutis ferrugineis albo-marginatis. *Jamaica.*

vesiculosus. 59–60. L. foliaceus, membranaceo-pellucidus lobatus undulatus vesiculosus, vesiculis turbinatis inferne aperris, apice scutelligeris, scutellis convexis rufis.

dissectus. 66–67. L. foliaceus, depressus laciniato-lobatus, (junior multifidus) obtusus lævis utrinque albidus, peltis concavis sparsis. *Jamaica.*

tomentosus. 67–68. L. foliaceus, depressus, membranaceus rotundatus inciso-lobatus lævissimus, lobis 2-fidis, inferne villoso-tomentosus. *Jamaica.*

aggregatus. 106–107. L. fruticulosus, perforatus ramosissimus, ramulis erectis, tuberculis granulosis aggregatis terminalibus. *Jamaica.*

melanocarpus. 109–110. L. fruticulosus, solidus ramosus albidus, ramulis foliolisque compressis, tuberculis globosis depressis atro-tomentosis. *Jamaica.*

ramulosus. 111–112. L. fruticulosus, solidus tectus ramosus, foliolis filamentosis, tuberculis globosis solidis terminalibus. *Jamaica.*

FUCUS.

trifarius. 27–28. F. frondе triquetra ramosa, foliis trifariis apice bifidis. *Fucus triquetrer.* Gmel. fuc. *Jamaica.*

ULVA.

montana. 1–2. U. plana reniformis sessilis aggregata zonata subtus incana.
Montes cæruleæ Jamaicæ.

BYSSUS.

sanguinea. 6–7. B. capillacea velutina perennis coccinea cortici adnascens.
Jamaica.

FUNGI.

AGARICUS.

fasciatus. 38–39. A. acaulis, convexus ferrugineus pubescens, margine integro, lamellis alternis interruptis cinereis.
Jamaica.

radiatus. 38–39. A. acaulis flabelliformis albidus villosus, margine incisо-crenato; lamellis concoloribus.
Jamaica.

BOLETUS.

membranaceus. 8–9. B. acaulis gregarius proliferus submembranaceus lævis radiatus albus, poris erosis difformibus.

villosus. 2–7 B. acaulis, submembranaceus fasciatus griseo-albidus villosus, poris difformibus dentatis.
Jamaica.

hydnoi-

hydnoides. 2–3. B. acaulis crassus setis ramosis erectis densis nigris superne tectus, poris tenuissimis teretibus.
Jamaica.

fasciatus. 2–3. B. acaulis durus superne inæqvalis fuscus nigro-fasciatus, poris albidis tenuissimis.
Jamaica.

resupinatus. 7–8. B. acaulis resupinatus subtus glabriusculus albus, superne poris impalpabilibus fuscis.
Jamaica.

microporus. 7–8. B. acaulis ligneus durus difformis inæqvalis, poris inæqvalibus impalpabilibus pallidis. Poria 4. *Brown. jam.* 77.
Jamaica.

HYDNUM.

agaricoides. 7. H. acaule convexum læve pallidum, subtus ferugineum.
Jamaica.

resupinatum. 8. H. acaule planum imbricatum subtus scabrum, supra setis ramentaceis ferrugineis tectum.
Jamaica.

sericeum. 9. H. acaule imbricatum planum, textura molli, utrinque sericeum exalbido-virescens.
Jamaica, Hispaniola.

HELUELLA.

versicolor. 3. H. acaulis membranacea fasciis discoloribus, inferne lævis alba.
Jamaica.

vremellina. 4. H. acaulis coriacea undulata lævis plumbea, subtus incano-villosa.
Jamaica.

atrata. 5. H. acaulis membranacea fragilis utrinque lævis, nigra.
Jamaica.

pallida. 6. H. acaulis coriacea fragilis utrinque lævis, ſuperne fuſca, inferne albeſcens.
Jamaica.

PEZIZA.

nigreſcens. 6–7. P. globoſo-campanulata obliqva, intus glabra atra extus incano-villoſa; margine integro.
Jamaica.

flava. 6–7. P. globoſo-campanulata obliqva, intus pubeſcens extus glaberrima, utrinque flava; margine integro.
Jamaica, Hiſpaniola.

CLAVARIA.

fuſca. 2–3. C. cæſpitoſa fuſca, caulibus ſubſimplicibus compreſſis baſi coalitis tomentoſis, apice interdum furcatis.
Hiſpaniola.

ADDENDA & CORRIGENDA.

p. 12. post CYNOMORIUM *jamaicenſ.*

coccineum. l. C. *ſtipite ſquamoſo, amento cylindraceo, ſquamis imbricatis ovatis retuſis.*
Cynomorium *Linn. Mich.*

p. 15. post THOUINIAM *liguſtrinam.*

nutans. l. T. *foliis ellipticis paniculis axillaribus, floribus nutantibus* T. nutans *Linn.*

p. 29. poſt DIODIAM *ſimplicem:*

virginica. l. D. *caule ramoſo procumbente lævi.*
Diodia *virginica. Linn.*

p. 31. poſt ÆGIPHILAM *elatam:*

martinicenſis. l. AE. *foliis ovato-lanceolatis acuminatis glabris, ramis diffuſis, paniculis terminalibus axillaribusve, calycibus glabris.* AE. martinicenſis *Linn.* Jacq.

p. 32. poſt SAMARAM *coriaceam:*

lata. l. S *floribus confertis pedicellatis, foliis ovatis obtuſis.* S. læta. *Linn.*

p. 50. poſt ITEAM *Cyrillam:*

virginica. l. I. *foliis ovatis acutis ſerratis.* Itea virginica. *Linn.*

p. 51. poſt HIRTELLAM *paniculatam:*

americana. l. H. *foliis ovato-lanceolatis, ramulis hirſutis, racemis erectis ſimplicibus, floribus 5-dris.* H. americana *Linn.*

p. 58. exclude *Cocoem aciculatem*, quæ eſt Bactris minor Jacq. I: Cocos guienenſis. *Linn.* Ejus loco inſeritur:

aculeata. 3. C. aculeato-ſpinoſa, caudice fuſiformi, frondibus pinnatis, ſtipitibus ſpathisque ſpinoſis. Cocos aculeatus. *Jacq. am.* 278. t. 179. ?
Palma pinnis & caudice ubique aculeatiſſimis fructu majuſculo. *Brown. jam.* 344. 7.
Palma tota ſpinoſa major. *Sloan.* h. 2. 119. t. 214.
Jamaica, Hiſpaniola. ♄.

p. 59. post GUETTARDAM *rugosam* :

speciosa. 1. G. *foliis cordatis lato-ovatis subsericeis, floribus subhexandris, tubo elongato.* G. speciosa. *Linn.*

p. 75. post TRIOPTERIDEM *rigidam* :

jamaicensis. 1. T. *foliis oblongis acuminatis venosis nitidis, racemis compositis terminalibus laxis, capsulis 3-alatis.*
T. jamaicensis. *Linn.*

---

p. 21. lin. 26. *loco* Paspatum *leg.* Paspalum.
22. — 2. *loco* subsolitaris *leg.* subsolitari.
31. — 1. *loco* Triandria *leg.* Tetrandria.
31. — 27. *loco* AEgiphila *leg.* AEgiphila.
62. — 4. *loco* Alophyllus *leg.* Allophylus.

IN-

INDEX.

Columna prior numerum ſpecierum, poſterior paginam indicat.

A.

Acalypha 9. 99.
Achania 2. 102.
Achyranthes 1. 51.
Acidoton 1. 83.
Acroſtichum 8. 128.
Adianthum 10. 134.
Aegiphila 3. 31.
Aeſchynomene 1. 107.
Agaricus 12. 148.
Agroſtis 1. 25.
Alchemilla 1. 38.
Alchornea 1. 98.
Allophylus 3. 62.
Alpinia 1. 11.
Althæa 2. 101.
Amomum 1. 11.
Amerimnon 2. 104.
Ammannia 1. 33.
Anacallis 1. 40.
Andromeda 3. 73.
Andropogon 3. 26.
Anthoceros 1. 146.
Apeiba 4. 83.
Aralia 2. 55.
Aralia 5. 46.
Argythamnia 1. 39.
Ariſtolochia 2. 126.
Aſclepias 1. 57.
Aſplenium 8. 129.
Ayenia 1. 97.

B.

Baniſteria 1. 75.
Bauhinia 1. 66.
Begonia 2. 86.
Bellonia 1. 42.
Bidens 1. 110.
Bignonia 3. 91.
Boehmeria 5. 24.
Boletus 6. 148.
Bromelia 2. 56.
Broſimum 2. 12.
Bruntelſia 1. 90.
Bryonia 1. 116.
Bryum 5. 139.
Buchnera 1. 92.
Bumelia 7. 50.
Byſſus 1. 148.

C.

Cacalia 1. 110.
Cactus 2. 77.
Calea 1. 113.
Callicarpa 2. 31.
Calyptranthes 3. 79.
Capparis 2. 81.
Camocladia 1. 17.
Cardioſpermum 1. 64.
Carex 1. 18.
Carolinea 1. 101.
Caſſia 3. 66.

Catesbæa	1.	30.
Celtis	3.	55.
Cenchrus	1.	26.
Cephaëlis	4.	45.
Ceſtrum	1.	49.
Chionanthus	2.	13.
Chloris	5.	25.
Chryſophyllum	3.	49.
Cinchona	3.	41.
Cineraria	2.	113.
Citharexylon	3.	91.
Clavaria	1.	150.
Clethra	1.	74.
Clinopodium	1.	88.
Clitoria	1.	106.
Coccoloba	1.	64.
Coccoſipſilum	1.	31.
Cocos	1.	151.
Columnea	3.	93.
Conyza	2.	112.
Cordia	2.	47.
Coſtus	2.	11.
Cranichis	5.	120.
Crantzia	1.	38.
Croton	9.	100.
Cupania	3.	61.
Cynanchum	2.	52.
Cynomorium	2.	12.
Cyperus	4.	20.

D.

Daphne	3.	63.
Dichondra.	1.	54.
Diodia	4.	29.
Dioſpyros	1.	62.
Dolichos	2.	105.
Dorſtenia	1.	34.

E.

Echites	4.	52.
Eclipta	1.	114.
Ehretia	1.	47.
Elephantopus	2.	115.
Epidendrum	49.	120.
Epigea	1.	73.
Erigeron	1.	113.
Ernodea	1.	29.
Eroteüm	2.	85.
Erythroxylon	1.	75.
Ethulia	1.	111.
Eupatorium	7.	111.
Euphorbia	3.	76.
Evolvolus	1.	55.

F.

Fagara	4.	33.
Ficus	1.	127.
Fontinalis	5.	138.
Fuchſia	1.	62.
Fucus	1.	144.

G.

Galega	1.	108.
Gardenia	3.	51.
Geoffræa	1.	106.
Geſneria	9.	89.
Glycine	2.	105.

Gnaphalium	2.	112.
Gratiola	1.	14.
Guettarda	3.	59.
Gymnanthes	2.	95.

H.

Hamellia.	4.	46.
Hedera.	2.	51.
Hedwigia	1.	62.
Hedyosmum	2.	84.
Hedyotis	1.	29.
Hedysarum	8.	106.
Helicteres	1.	98.
Heliotropium	1.	40.
Helvella	4.	149.
Hemionitis	1.	129.
Hepetis	1.	56.
Hibiscus	1.	102.
Hillia	1.	58.
Hippocratea	1.	17.
Hirtella	2.	51.
Hoffmannia	1.	30.
Holosteum	1.	27.
Homalium	2.	86.
Hydnum	3.	149.
Hydrocotyle	1.	54.
Hydrolea	1.	54.
Hypnum	27.	140.

I.

Iacquinia	1.	47.
Iatropha	1.	98.
Itea	1.	50.
Iungermannia	28.	143.
Iusticia	7.	13.
Ixora.	2.	30.

K.

Kyllinga	1.	20.

L.

Labatia	1.	32.
Laciſtema	1.	12.
Laetia	2.	83.
Lantana	2.	92.
Laugeria	2.	48.
Laurus	9.	65.
Lavenia	1.	112.
Leerſia	2.	21.
Legnotis	2.	84.
Lichen	18.	146.
Lightfootia	1.	83.
Limodorum	2.	119.
Lindernia	1.	92.
Lippia	1.	92.
Liſianthus	4.	40.
Lithophila	1.	14.
Lobelia	1.	117.
Loranthus	3.	58.
Ludwigia	1.	33.
Lycopodium	4.	137.
Lythrum	2.	76.

M.

Magnolia	1.	87.
Malaxis	2.	119.
Malpighia	3.	74.

Manettia	1.	37.	
Manisuris	1.	25.	
Marattia	1.	128.	
Marchantia	1.	145.	
Marila	1.	84.	
Matricaria	1.	114.	
Melampodium	1.	114.	
Melastoma	36.	68.	
Melia	1.	67.	
Melochia	3.	97.	
Microtea	1.	53.	
Milium	4.	24.	
Mimosa	6.	85.	
Mnium	3.	139.	
Myginda	2.	39.	
Myristica	2.	96.	
Myrodia	2.	102.	
Myrtus	16.	77.	

O.

Ochna	1.	67.	
Ochroma	1.	97.	
Olyra	1.	21.	
Omphalea	2.	95.	
Orchis	1.	118.	
Osmunda	4.	127.	

O.

Panax	1.	54.	
Panicum	19.	22.	
Paspalum	4.	21.	
Passiflora,	3.	97.	
Paullinia	2.	64.	
Pectis	1.	114.	
Peraloma	2.	73.	
Peziza	2.	150.	
Phlomis	1.	88.	
Phyllantha	3.	27.	
Picrammia	1.	27.	
Pinus.	1.	103.	
Piper	17.	15.	
Pisonia	2.	60.	
Poa	2.	26.	
Polypodium	31.	130.	
Polytrichum	1.	139.	
Pontederia	2.	57.	
Portlandia	1.	48.	
Possira	2.	81.	
Pothos	2.	38.	
Prinos	2.	58.	
Prunus	2.	80.	
Psidium	2.	77.	
Psychotria	23.	42.	
Pteris	3.	129.	

Q.

Quassia	1.	67.	

R.

Rayania	2.	59.	
Rhamnus	2.	50.	
Rhexia	2.	61.	
Riccia	1.	146.	
Robinia	1.	106.	
Rocheforria	2.	53.	
Rolandra	1.	116.	

Rondeletia	8.	41.
Ruellia	3.	93.
Ruyſchia	2.	50.

S.

Sabicea	2.	46.
Sacharum	1.	21.
Salvia	2.	14.
Samara	1.	32.
Samyda	4.	68.
Satyrium	5.	118.
Schæfferia	2.	38.
Schoenus	10.	19.
Scleria	6.	18.
Scutellaria	1.	89.
Securidaca	1.	104.
Serapias	2.	119.
Sicyos	1.	116.
Sida	4.	101.
Siſyrinchium	1.	17.
Sloanea	2.	82.
Smilax	1.	59.
Solandra	1.	42.
Solanum	3.	47.
Sonchus	1.	110.
Sophora	1.	66.
Spermacoce	1.	29.
Spilanthus	1.	110.
Stachys	1.	88.
Staphylea	1.	55.
Sterculia	1.	98.
Styloſanthes	2.	108.
Styrax	1.	74.
Symplocos	1.	109.

T.

Tabernæmontana	1.	52.
Tamonea	2.	94.
Tanæcium	2.	91.
Teramnus	2.	105.
Terminalia	2.	68.
Ternſtrômia	3.	81.
Tetranthus	1.	115.
Teucrium	1.	88.
Thouinia	1.	14.
Thrinax	1.	57.
Thymus	1.	89.
Tillandſia	5.	56.
Tournefortia	1.	40.
Tradeſcantia	5.	57.
Trichilia	3.	67.
Trichomanes	14.	136.
Triopteris	2.	75.
Triumfetta	2.	76.
Trixis	3.	115.
Tuſſilago	2.	113.

U.

Ulva	1.	148.
Urtica	22.	35.
Utricularia	1.	14.
Uvaria	1.	87.

V.

Vaccinium	1.	62.
Valentinia	1.	63.
Varronia	1.	48.

Verbesina 1. 114.
Viburnum 1. 54.
Viola 1. 117.
Viscum 1. 32.
Vitex 2. 59.

W.

Wallenia 1. 31.
Weinmannia 1. 63.

X.

Xiphidium 1. 17.
Xylophylla 4. 28.

HOLMIÆ,

Typis And. Jac. Nordström.

MDCCLXXXVIII.

New York Botanical Garden Library
QK225 .S9
Swartz, Olof/Nova genera & species plant
gen
3 5185 00135 7233